

دما-فشارسنجی و تفسیر جایگاه تکتونیکی سنگ‌های رخساره شیست آبی مجموعه دگرگونی اسالم (شمال غرب رشت)

محمد سعادت، محسن نصرآبادی* و عباس آسیابانهای رضایی
گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

در منطقه اسالم، شمال غرب رشت، مجموعه‌ای از سنگ‌های دگرگونی شامل: انواع شیست سبز، میکاشیست و سرپانتینیت برونزد دارد. در این پژوهش برای نخستین بار سنگ‌های رخساره شیست آبی از این مجموعه دگرگونی گزارش می‌شود. پاراژنز کانی‌شناسی شیست‌های آبی متابازیتی شامل: گلوکوفان، اپیدوت، کلریت و فنزیت است. در حالی که در انواع متاپلیتی، گارنت، فنزیت، کلریتوئید و فلدسپار وجود دارد. شرایط دگرگونی محاسبه شده به وسیله نرم‌افزار ترموکالک، محدوده پایداری کانی‌ها و ترموبارومترهای قراردادی، دمای ۳۵۰ تا ۵۵۰ درجه سانتیگراد و فشار ۷ تا ۱۲ کیلو بار را نشان می‌دهد. شرایط دما و فشار دگرگونی و تنوع سنگ مادر (متاپلیت، مرمر، متابازیت، سرپانتینیت) این مجموعه دگرگونی بیانگر تشکیل آنها در منشورهای بهم افزوده نوع اقیانوس آرام (شیست آبی نوع B) است. شاید این مجموعه دگرگونی در امتداد منشورهای بهم افزوده زمین‌درز پالئوتتیس و در نتیجه آغاز فرورانش حوضه اقیانوسی پالئوتتیس به زیر حاشیه جنوبی اوراسیا در زمان کربونیفر به وجود آمده باشد.

واژه‌های کلیدی: شیست آبی، منشورهای بهم افزوده، پالئوتتیس، مجموعه دگرگونی اسالم، البرز

مقدمه

مشاهده نمود. یکی از این شواهد، توالی‌های افیولیتی و سنگ‌های دگرگونی فشار بالای مرتبط با فرورانش و فرارانش لیتوسفر اقیانوسی است. بیرون‌زدگی سنگ‌های دگرگونی فشار بالا-دما پایین مزوزوئیک و سنوزوئیک در ایران که حاصل فرورانش حوضه اقیانوسی نئوتتیس و شاخه‌های فرعی جوان‌تر است از چندین نقطه گزارش شده که عبارتند از: اکلوزیت و شیست‌های آبی منطقه سیستان و شرق ایران

سنگ‌های رخساره شیست آبی یکی از بارزترین شاخص‌های پهنه‌های فرورانش فانروزوئیک در اطراف اقیانوس آرام و نوارهای کوهزایی نوع آلپ است (Miyashiro, 1973; Maruyama et al., 1996). سرزمین ایران از جمله مناطق کوهزایی کمر بند آلپ-همیالیا است که می‌توان در آن شواهد وجود حوضه‌های اقیانوسی پالئوتتیس و نئوتتیس را

بین طول‌های جغرافیایی $48^{\circ} 53'$ تا $48^{\circ} 59'$ و عرض‌های جغرافیایی $37^{\circ} 37'$ تا $37^{\circ} 42'$ واقع شده است و بخشی از ارتفاعات تالش محسوب می‌شود (شکل ۱). در تقسیم‌بندی پهنه‌های زمین‌ساختی ایران (Stöcklin, 1968) این منطقه در محدوده کوه‌های البرز بین دو بلوک ایران مرکزی در جنوب و توران در شمال قرار می‌گیرد. طبق تقسیم‌بندی Alavi (۱۹۹۱) این منطقه جزو زمین‌درز کهن است. گسترش جغرافیایی این ارتفاعات از جمهوری آذربایجان تا سفیدرود در جنوب رشت است. بخش وابسته به ایران این ارتفاعات با عرض ۵۰ کیلومتر، بیشتر شامل: رسوبات به شدت دگرشکل شده فانروزوئیک است. سه مجموعه دگرگونی شامل: شاندرمن، گشت و اسالم در این منطقه برونزد دارد. از نکات در خور توجه ارتفاعات تالش، وجود واحدهای آتشفشانی و آتشفشانی-رسوبی ضخیم پالئوزوئیک در آن است. توالی ضخیمی از آهک‌های فسیل‌دار سیلورین و پرمین در منطقه وجود دارد؛ اما اثری از آهک‌های تریاس دیده نمی‌شود. واحدهای ضخیمی از کربنات‌های دگرگون شده و متاپلیت پالئوزوئیک بالایی که طی کوهزایی سیمین پیشین دگرشکل شده است در بخش میانی ارتفاعات تالش دیده می‌شود. ارتفاعات تالش، به عنوان بخشی از رشته کوه البرز در شمال ایران، ناحیه‌ای کلیدی برای پژوهش جایگاه و مسیر تکاملی پهنه برخوردی سیمین پیشین است (Zanchetta et al., 2009). این واحدها همراه با مجموعه‌های دگرگونی شاندرمن و گشت، به طور ناپیوسته توسط سازند زغال‌دار دریایی شمشک (که بیانگر مرحله رشد و فرسایش کمربند کوهزایی سیمین پیشین است) پوشیده می‌شود. مولاس قاعده‌ای در ارتفاعات تالش دارای قطعاتی از سنگ‌های دگرگونی بوده و سن تشکیل آن ژوراسیک زیرین است (Fursich et al., 2009). این امر نشان‌دهنده سن جوان‌تر از سیمین پیشین،

Fotoohi Rad et al., (2005؛ Tirrul et al., 1983) شیست‌های آبی ناحیه سبزواری Baroz et al., ؛Delaloye and Desmons, 1980) 1983؛ 1983؛ Macaudière, 1983؛ Nasrabady, 2009؛ Omrani et al., 2013a؛ Nasrabady et al., 2012؛ Agard؛ Sabzehi, 1974)؛ Oberhänsli et al., 2007؛ et al., 2006) شیست‌های آبی محدوده مکران (Delaloye and Desmons, 1980) و اکلوزیت‌های شهرکرد (Davoudian et al., 2008).

بر خلاف سنگ‌های فشار بالای مرتبط با حوضه اقیانوسی نئوتتیس که از گسترش به نسبت وسیعی در مناطق افیولیتی اطراف خرده قاره ایران مرکزی و کمربند چین‌خورده زاگرس برخوردار هستند؛ بقایای پالئوتتیس و سنگ‌های دگرگونی حاصل از بسته شدن آن دارای برونزد محدودتری در ایران است که شامل: مجموعه افیولیتی و سنگ‌های دگرگونی درجه پایین اطراف مشهد (Sengör, 1984؛ Alavi, 1991؛ Alavi et al., 1997) افیولیت‌ها و شیست‌های آبی مجموعه دگرگونی انارک در ایران مرکزی (Bagheri and Stampfli, 2008؛ 2009؛ Zanchi et al., 2011؛ Torabi) و مجموعه‌های اولترابازیک و اکلوزیت‌های مجموعه دگرگونی شاندرمن در شمال ایران (Zanchetta et al., 2009؛ Omrani et al., 2013b) می‌شود.

در این پژوهش، برای نخستین بار به وجود سنگ‌های رخساره شیست آبی در مجموعه دگرگونی اسالم پی برده شد و بر اساس شواهد پتروگرافی، ترکیب کانی‌شناسی و محاسبات دما-فشارسنجی، ضمن تشریح شرایط دگرگونی به تفسیر محیط تکتونیکی تشکیل آنها اقدام شده است.

زمین‌شناسی منطقه

مجموعه دگرگونی اسالم در شمال غرب رشت،

برای جایگیری مجموعه دگرگونی شاندرمن در سطح زمین است (Seyed-Emami, Clark *et al.* 1975؛ 2003؛ Ghasemi-Nejad *et al.*, 2004). بر خلاف مجموعه دگرگونی شاندرمن که با کشف و گزارش وجود اکلوزیت از آن (Zanchetta *et al.*, 2009؛ Omrani *et al.*, 2013b) مطالعات به نسبت زیادی را به خود معطوف داشته (Omrani, 2010؛ Omrani *et al.*, 2010؛ Nori *et al.*, 2012)، مجموعه دگرگونی اسالم بیشتر به صورت توصیفی در نقشه‌های زمین‌شناسی ۱/۱۰۰۰۰۰ خلخال-رضوانشهر (Asadian *et al.*, 1999) و ۱/۲۵۰۰۰۰ بندر انزلی (Clark *et al.*, 1975) بررسی شده است. Davies و همکاران (۱۹۷۲) سنگ‌های دگرگونی اطراف رشت را بخشی از پی‌سنگ پره‌کامبرین توران در نظر گرفتند. از نظر Nabavi (۱۹۷۶) این دگرگونی‌ها متعلق به زیر پهنه گرگان-رشت است. Sengör (۱۹۸۴) و Alavi (۱۹۹۶) مجموعه دگرگونی شاندرمن را از نظر سنی و جایگاه تکتونیکی معادل افیولیت‌های مشهد محسوب کرده‌اند.

مشاهدات صحرایی

مجموعه دگرگونی اسالم به مساحت تقریبی ۹۰ کیلومتر مربع در جنوب غرب اسالم برونزد دارد (شکل ۱). این مجموعه دگرگونی با توپوگرافی مرتفع سازنده ارتفاعات جنوب اسالم بوده و با پوشش جنگلی متراکم مشخص است (شکل ۲-A). پوشش جنگلی انبوه و هوازدگی شدید که با وجود قشر ضخیمی از خاک توأم است از محدودیت‌های شایان ذکر در نمونه‌برداری این منطقه است. با این حال سعی شده است که با انتخاب مسیر نمونه‌برداری در امتداد دره‌های رودخانه‌ای و ترانشه راه‌ها و برداشت نمونه‌های برجا تا حد امکان این محدودیت مرتفع گردد. سنگ‌های رخساره شیست سبز از هر دو نوع گرین‌استون و شیست سبز معمول‌ترین سنگ‌های



دگرگونی مجموعه دگرگونی اسالم است. سنگ‌های رخساره شیست آبی در منطقه مطالعه شده، پروتولیت متبازیت (شیست آبی) و متاپلیت (کلریتوئید-گارنت‌شیست) دارد. در نمونه دستی شیست‌های آبی متبازیتی بررسی شده، ریز تا متوسط بلور بوده و بلورهای گلوکوفان، اپیدوت و فنزیت با چشم غیر مسلح مشاهده می‌شود. سوزن‌های آمفیبول در بعضی از نمونه‌ها فاقد جهت‌یافتگی ترجیحی است. در نتیجه در سنگ، تنها ساختار فولیاسیون به وجود آمده و اثری از لیناسیون دیده نمی‌شود (شکل ۲-B). نخستین نسل فولیاسیون، حاصل جهت‌یافتگی ترجیحی بلورهای گلوکوفان، کلریت و فنزیت است و دومین نسل، از نوع خمیده بوده و در نتیجه چین‌خوردگی نسل اول فولیاسیون در حال تشکیل است (شکل ۲-C). با توجه به وجود دو نسل فولیاسیون در مقیاس ماکروسکوپی، حداقل دو فاز دگرشکلی بر سنگ‌های دگرگونی منطقه اعمال شده است. لایه‌بندی ترکیبی در شیست‌های آبی منطقه به صورت تناوبی از باندهای تیره (غنی از گلوکوفان) و سبز (اپیدوت) مشاهده می‌شود (شکل ۲-C).

روش انجام پژوهش

روش انجام پژوهش شامل: نمونه‌برداری از برونزد متبازیت و متاپلیت‌های فشار بالا به منظور تهیه مقاطع نازک بوده است. با توجه به پوشش جنگلی انبوه و وجود قشر ضخیمی از خاک در بیشتر مناطق، به منظور نمونه‌برداری درجا از سنگ‌های دگرگونی منطقه، مسیر دره‌های رودخانه‌ای و ترانشه راه‌های محلی انتخاب شد. بررسی‌های دقیق پتروگرافی و تجزیه ریزکاو الکترونی روی ۱۰۰ نقطه از کانی‌های گوناگون با دستگاه ریز پردازنده نوع Cameca SX100 در دانشگاه اشتوتگارت آلمان انجام شده است. در طول

(Calc Min) و به منظور تخمین شرایط دما و فشار دگرگونی، از نرم افزار ترموکالک، دما-فشارسنج‌های قراردادی و نتایج داده‌های پترولوژیکی آزمایشگاهی استفاده شده است.

انجام تجزیه ریزکاو الکترونی ولتاژ شتاب دهنده دستگاه 15Kv، شدت جریان 15nA و زمان شمارش، ۳۰ ثانیه بوده است. در محاسبه فرمول ساختمانی کانی‌ها از نرم‌افزار کالک‌مین



شکل ۱- نقشه‌ای ساده از واحدهای ساختاری ایران و موقعیت زمین‌درزهای پالئوتتیس و نئوتتیس همراه با نقشه زمین‌شناسی ساده از منطقه اسالم، با تغییرات از نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ خلخال-رضوانشهر (Asadian et al., 1999).







و فنزیت بوده و نسل دوم فولیاسیون، حاصل چین‌خوردگی است (شکل ۳-۱). آمفیبول جهت یافته با چند رنگی سبز کم‌رنگ (اکتینولیت)، کلریت، اپیدوت و آلپیت کانی‌های سنگ‌ساز شیست‌های سبز منطقه است (شکل ۳-۲). پاراژنز کانی‌شناسی متاپلیت‌های فشار بالای مجموعه دگرگونی اسالم شامل: فنزیت، کلریتوئید، گارنت، کوارتز و فلدسپار است. ورقه‌های فنزیت و کلریتوئید جهت‌یافته، فولیاسیون سنگ را به وجود آورده‌اند (شکل ۳-۳). کلریتوئید در نتیجه دگرگونی پسروده در حال تبدیل به بیوتیت و اکسید آهن است (شکل ۳-۴).

پتروگرافی

کانی‌های اصلی شیست‌های آبی متابازیتی گلوکوفان+اپیدوت+فنزیت±کوارتز است. آلپیت و کلریت نیز محصول دگرگونی پسروده بوده و از کانی‌های ثانویه محسوب می‌شود. در بعضی از نمونه‌ها، سوزن‌های آمفیبول تنها سازنده فولیاسیون سنگ بوده و به علت عدم جهت یافتگی خطی، لیناسیون در آنها تشکیل نشده است (شکل ۳-۴). در مقطع میکروسکوپی نیز لایه‌بندی ترکیبی به صورت لایه‌های غنی از اپیدوت و غنی از گلوکوفان مشاهده می‌شود (شکل ۳-۵). نخستین نسل فولیاسیون حاصل جهت یافتگی ترجیحی گلوکوفان



شکل ۲- A) دورنمایی از مجموعه دگرگونی اسالم که سازنده ارتفاعات منطقه بوده و از پوشش گیاهی متراکم برخوردار است؛ B) اجتماع سوزن‌های آمفیبول با جهت یافتگی تصادفی در سطح فولیاسیون نمونه شیست آبی؛ C) نمونه‌ای از شیست آبی که فولیاسیون نسل دوم آن تشکیل شده و لایه‌بندی ترکیبی به صورت تناوبی از باندهای غنی از گلوکوفان (بخش تیره) و غنی از اپیدوت (بخش سبز رنگ) نشان می‌دهد.



شکل ۳- تصاویر میکروسکوپی سنگ‌های مجموعه دگرگونی اسالم؛ A) بلورهای گلوکوفان با جهت یافتگی تصادفی که سازنده بافت مشبک نمونه شیست آبی است؛ B) کانی‌های سنگ‌ساز نمونه‌های شیست سبز شامل: آمفیبول (با چند رنگی سبز کم‌رنگ) و کلریت جهت یافته، اپیدوت و آل بیت است که لایه‌بندی ترکیبی به صورت تناوبی از باندهای غنی از گلوکوفان و غنی از اپیدوت نشان می‌دهد؛ C) در بعضی از نمونه‌های شیست آبی، نسل دوم فولیاسیون (S2) از چین‌خوردگی نسل اول (S1) در حال تشکیل است؛ D) مجموعه کلریت + آل بیت + اپیدوت + اکتینولیت که بیان‌کننده رخساره شیست سبز است، پارائز کانی‌شناسی غالب در منطقه است؛ E) در نمونه متاپلیتی رخساره شیست آبی، پارائز کانی‌شناسی کلریتوئید + فنزیت + کوارتز + گارنت مشاهده می‌شود؛ F) در نمونه‌های کلریتوئیددار، کلریتوئید توسط بیوتیت و اکسید آهن در حال جانشینی است. کلیه تصاویر در نور PPL گرفته شده است.

شیمی کانی‌ها

به منظور شناسایی ترکیب شیمیایی کانی‌ها و انجام محاسبات دما-فشارسنجی، از کانی‌های سه نمونه از سنگ‌های رخساره شیسست آبی (دو متابازیت و یک متاپلیت) بیش از ۱۵۰ تجزیه ریزکاو الکترونی به عمل آمد. در این بخش به تفصیل ترکیب شیمیایی کانی‌ها بحث خواهد شد.

آمفیبول: مقدار NaB آمفیبول‌ها از ۱/۸۲ تا ۱/۹۶ در تغییر است (جدول ۱). با توجه به پارامترهای تقسیم‌بندی آمفیبول (Leak et al., 2004) که بر اساس میزان Na_B ، $\text{Mg\#}$ ، Si و نسبت $\text{Fe}^{\text{III}}/\text{Al}^{\text{VI}}$ است، آمفیبول‌های مطالعه شده از نوع گلوکوفان هستند (شکل ۴).

فلدسپار: فلدسپارهای موجود در نمونه‌های شیسست آبی متابازیتی مطالعه شده از نوع آلبیت (Ab_{99}) است (جدول ۱). در حالی که، فلدسپار موجود در انواع متاپلیت از نوع ارتوز (Or_{99}) است (جدول ۲).

اپیدوت: اپیدوت تنها در نمونه‌های شیسست آبی متابازیتی موجود است. با توجه به نتایج تجزیه

ریزکاو الکترونی (جدول ۱) مقدار سازنده پیستاسیت ($X_{\text{ps}} = \text{Fe}^{3+}/\text{Al}^{3+} + \text{Fe}^{3+}$) موجود در اپیدوت‌ها از ۲۷ تا ۳۰ درصد متغیر است.

فنزیت: مطابق تجزیه ریزکاو الکترونی و محاسبه فرمول میکای سفید، درصد و نوع اعضای نهایی انواع متابازیتی به قرار زیر است: مسکویت ۴۰ تا ۷۱ درصد، سلادونیت ۱۴ تا ۵۳ درصد و پاراگونیت ۴ تا ۱۳ درصد (جدول ۱). در حالی که، فنزیت نمونه متاپلیت رخساره شیسست آبی (کلریتوئید-گارنت‌شیست) غنی‌تر از سلادونیت و فقیرتر از مسکویت بوده و مقادیر اعضای نهایی این نمونه به شرح زیر است: مسکویت ۳۱ تا ۴۸ درصد، سلادونیت ۳۲ تا ۵۱ درصد و پاراگونیت ۴ تا ۹ درصد (جدول ۲).

کلریت: تعداد کاتیون‌های Si موجود در ترکیب شیمیایی نمونه‌های مطالعه شده ۵/۲۶ تا ۶/۵۵ است (جدول‌های ۱ و ۲). تفاوت ترکیبی چندانی در ترکیب کلریت نمونه‌های متابازیتی و متاپلیتی وجود ندارد و فقط در انواع متابازیتی از منیزیم غنی‌تر است (۶۵ تا ۶۶ X_{Mg}).


جدول ۱- نتایج تجزیه شیمیایی کانی‌های نمونه‌های شیسست آبی با پروتولیت بازیک؛ فرمول ساختمانی آمفیبول، فنزیت، فلدسپار، کلریت، تیتانیت و اپیدوت به ترتیب بر اساس ۲۳، ۱۱، ۸، ۲۸، ۴ و ۱۲/۵ اکسیژن محاسبه شده است.

metabasite												
Sample No. Ms44												
Mineral	Gln				Phn			fsp	Chl	Ep		
SiO_2	56.23	57.53	55.93	56.51	49.96	48.96	50.03	68.34	26.99	37.48	37.5	37.95
TiO_2	0.08	0.01	0.02	0.09	0.15	0.2	0.14	0.01	0.03	0.02	0.04	0.13
Al_2O_3	8.79	9.13	9.54	8.71	26.91	27.7	26.73	19.7	20.32	22.45	23.44	23.1
FeO_t	14.25	13.3	15.53	14.03	3.95	4.4	4.08	0.37	18.05	15.56	14.05	13.71
MnO	0.1	0.03	0.06	0.14	0.0	0.03	0.01	0.0	0.21	0.0	0.34	0.36
MgO	10.05	10.34	10.0	10.52	3.13	2.79	3.14	0.0	20.58	0.02	0.0	0.15
CaO	0.97	0.32	0.31	1.051	0.02	0.0	0.08	0.16	0.0	22.76	23.15	22.57
Na_2O	7.07	7.42	6.84	6.93	0.44	0.51	0.41	11.94	0.0	0.0	0.04	0.32
K_2O	0.02	0.01	0.0	0.02	10.08	10.7	10.84	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	97.56	98.09	98.23	98.00	94.64	95.29	95.46	100.55	86.14	98.29	98.56	98.29
Si	7.84	7.92	7.71	7.83	6.73	6.61	6.74	2.97	5.56	2.98	2.97	3.01
Ti	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.02	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Al^{IV}	0.15	0.07	0.28	0.16	1.26	1.38	1.25	1.01	2.43	2.1	2.18	2.16
Al^{VI}	1.29	1.4	1.26	1.25	3.0	3.02	2.99		2.49			
Fe^{3+}	0.63	0.59	1.09	0.71	0.01	0.1	0.1	0.01	0.0	0.93	0.83	0.81
Fe^{2+}	0.96	0.87	0.57	0.82	0.42	0.37	0.43	0.0	3.11	0.0	0.0	0.0

Rock type					metabasite							
Sample No.					Ms44							
Mineral	Gln				Phn			fsp	Chl	Ep		
ادامہ جدول ۱- ...												
Mn	0.01	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03	0.01	0.02	0.02
Mg	2.09	2.12	2.05	2.17	0.63	0.56	0.63	0.0	6.31	0.0	0.0	0.01
Ca	0.14	0.04	0.04	0.15	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	1.94	1.96	1.91
Na	1.91	1.98	1.83	1.86	0.11	0.13	0.1	1.00	0.0	0.0	0.0	0.04
K	0.0	0.0	0.0	0.0	1.85	1.84	1.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sum	15.02	14.99	14.83	14.96	14.02	14.03	14.12	4.99	19.93	7.96	7.96	7.96
Mg#	68	73	78	75	-	-	-	-	66	-	-	-
Na _B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ms	-	-	-	-	50	53	50	-	-	-	-	-
Cel	-	-	-	-	36	31	38	-	-	-	-	-
Pg	-	-	-	-	6	7	5	-	-	-	-	-
Ab	-	-	-	-	-	-	-	99	-	-	-	-
An	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-
Or	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-
Xps	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	27	27

ادامہ جدول ۱- ...

[illegible]



شکل ۴- مطابق نمودارهای تقسیم‌بندی آمفیبول‌ها (Leak *et al.*, 2004) آمفیبول شیست‌های آبی مطالعه شده از نوع گلوکوفان است.

جدول ۲- نتایج تجزیه شیمیایی کانی‌های نمونه‌های شیست آبی با پروتولیت پلیتی؛ فرمول ساختمانی گارنت و کلریتوئید بر اساس ۱۲ اکسیژن محاسبه شده است.

Rock type	metapelite											
Sample No.	Ms39											
Mineral	Grt				Cld			fsp	Chl	Phn		
SiO ₂	36.08	35.78	36.05	35.71	25.97	24.1	24.07	64.4	24.23	50.98	49.88	52.77
TiO ₂	0.05	0.05	0.18	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.05	0.24	0.2	0.14
Al ₂ O ₃	21.3	21.24	20.87	21.14	41.53	40.26	39.67	17.68	21.48	27.15	27.58	25.19
FeO _t	34.5	34.04	33.09	34.17	23.87	25.0	24.8	0.14	30.43	2.53	2.66	2.81
MnO	3.0	2.89	4.86	3.88	0.42	0.44	0.24	0.0	0.18	0.0	0.02	0.01
MgO	2.11	2.11	1.71	1.9	2.74	2.48	2.87	0.0	11.16	3.02	2.81	3.71
CaO	3.46	3.46	3.32	3.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.09	0.06	0.03
Na ₂ O	0.02	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.0	0.12	0.0	0.49	0.53	0.38
K ₂ O	0.0	0.0	0.01	0.01	0.0	0.0	0.0	16.99	0.0	10.02	10.24	10.0
Total	100.52	99.57	100.09	99.95	94.53	92.28	91.65	99.33	87.53	94.52	93.98	95.04
Si	2.9	2.9	2.92	2.9	2.09	1.99	2.0	3.0	5.26	6.82	6.74	7.00
Ti	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.02	0.01
Al ^{IV}	0.09	0.09	0.07	0.09	3.94	3.93	3.89	0.97	2.73	1.17	1.25	0.99
Al ^{VI}	1.92	1.94	1.92	1.92					2.77	3.1	3.14	2.94
Fe ³⁺	0.16	0.14	0.12	0.17	0.0	0.06	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fe ²⁺	2.14	2.15	2.1	2.12	1.6	1.66	1.63	0.0	5.53	0.28	0.3	0.31
Mn	0.2	0.19	0.33	0.26	0.02	0.03	0.01	0.0	0.03	0.0	0.0	0.0
Mg	0.25	0.25	0.2	0.23	0.33	0.3	0.35	0.0	3.61	0.6	0.56	0.73
Ca	0.29	0.3	0.28	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0
Na	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.0	0.12	0.13	0.09
K	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.01	0.0	1.71	1.76	1.69
Sum	7.95	7.96	7.95	7.95	7.98	7.97	7.96	4.99	19.93	13.83	13.90	13.76
Mg#	10	10	8	9	17	15	17	-	39	-	-	-
Grs	10	10	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Pyp	9	9	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Alm	74	74	71	73	-	-	-	-	-	-	-	-
Sps	7	7	11	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Ms	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	31	41
Cel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	33	51
Pg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	6
Ab	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
An	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Or	-	-	-	-	-	-	-	99	-	-	-	-

جدول ۳- علائم اختصاری کانی‌ها (Kretz, 1983)

نام کانی	علامت اختصاری	نام کانی	علامت اختصاری	نام کانی	علامت اختصاری
آلیت	Ab	گلوکوفان	Gln	اپیدوت	Ep
آندرادیت	Adr	فروسلاونیت	Fcel	فلوگوپیت	Phl
آلماندن	Alm	پاراگونیت	Pg	کوارتز	Qtz
آنورتیت	An	پارگازیت	Prg	سلاونیت	Cel
فلدسپار	Fsp	میکای سفید	Wmca	زوئیزیت	ZO
گروسولار	Grs	پیستاسیت	Ps	کلریتوئید	Ctd
گارنت	Grt	فرواکتینولیت	Fact	ژادئیت	Jd
ارتوز	Or	چرماکیت	Ts	کلینوزوئیزیت	Czo
پلاژیوکلاز	Pl	آمفیبول	Am	کلریت	Chl
پروپ	Prp	موسکویت	Ms	اسپسارتین	Sps
کلریتوئید آهن‌دار	fctd	کلریتوئید منگنزدار	Mnctd	سانیدینیت	San

دما-فشارسنجی

واکنش (۳)



ب) ترموبارومتري به وسیله محدوده پایداری کانی‌ها و شبکه‌های پتروژنتیک: با توجه به مطالعات تجربی Maruyama و همکاران (۱۹۸۶) حضور گلوکوفان در نمونه‌های بررسی شده، نشان‌دهنده فشار بیشتر از ۷ کیلو بار است. نتایج حاصل از مطالعات آزمایشگاهی Otsuki و Banno (۱۹۹۰) و Okrusch و همکاران (۱۹۷۸) بیانگر آن است که بیشینه دمای پایداری گلوکوفان کمتر از ۵۰۰ درجه سانتیگراد بوده است.

از طرفی، Frey و همکاران (۱۹۹۱) خاطرنشان کرده است که نبود لاوسونیت در شیست‌های آبی، بیانگر دمای بیشتر از ۳۳۰ درجه سانتیگراد است. بنابراین، محدوده دما و فشار سنگ‌های مطالعه شده معادل محدوده زیر رخساره اپیدوت-شیست آبی (Evans, 1990) است.

نظر به نبود امفاسیت و با توجه به منحنی پایداری آلیت (Holland, 1983) دامنه دمایی ۳۵۰ تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد و فشار کمتر از ۱۱ کیلو بار بوده است.


با توجه به شبکه پتروژنتیک رخساره شیست آبی متاپلیت‌ها (Bousquet et al., 2002)، حضور

در این بخش، با نرم‌افزار ترموکالک نسخه ۳-۲۶ و فازدیاگرام‌های حاصل از بررسی‌های آزمایشگاهی و ترموبارومترهای قراردادی، شرایط دما-فشار دگرگونی نمونه‌های شیست آبی تعیین شده است.

الف) نرم‌افزار ترموکالک: با توجه به نبود گارنت و محدود بودن تعداد فازها، محاسبه میانگین فشار و دما برای شیست‌های آبی متابازیتی توسط ترموکالک میسر نگردید.

برای شیست‌های آبی با پروتولیت پلیتی (کلریتوئید-گارنت‌شیست) شرایط دگرگونی محاسبه شده توسط نرم‌افزار ترموکالک شامل: فشار $11/2 \pm 1/5$ کیلو بار و دما 497 ± 80 درجه سانتیگراد است. در این محاسبات اکتیویته اعضای نهایی کانی‌ها به کمک نرم‌افزار AX به دست آمده است. واکنش‌های دگرگونی که به کمک آن میانگین فشار و دما محاسبه شده به شرح زیر است:

واکنش (۱)



واکنش (۲)



بحث و تفسیر محیط تکتونیکی

سنگ‌های دگرگونی فشار بالا-دما پایین شایسته آبی و اکلوزیت، اصلی‌ترین شاخص‌های پهنه‌های فرورانش و برخورد قدیمی هستند (Ernest, 1971). این نوع سنگ‌ها با سن مزوزوئیک و سنوزوئیک فراوان بوده اما انواع پالئوزوئیک به نسبت نادر است (Maruyama and Liou, 1998, 2005). این امر را می‌توان به سرد شدن فزاینده کره زمین با گذشت زمان و عدم حفظ این واحدهای سنگی به واسطه وقایع تکتونوترمال حاکم در دوران پالئوزوئیک نسبت داد (Agard *et al.*, 2005). همان طور که، در بخش مقدمه بیان شد؛ در ایران نیز سنگ‌های رخساره شایسته آبی و اکلوزیت پالئوزوئیک نسبت به انواع مرتبط با مزوزوئیک و سنوزوئیک از برونزدهای بسیار محدودتری برخوردار هستند. سنگ‌های رخساره شایسته آبی و اکلوزیت معمولاً به صورت بلوک‌های محدود نابرجا در ملانژ یا واحدهای تکتونیکی وسیع مجزا موجود است (Coleman and Lanphere, 1971). تفاوت در پروتولیت، توالی سنگ‌های همراه و تاریخچه و تحولات ساختاری این سنگ‌ها ناشی از تأثیر محیط تکتونیکی تشکیل آنها است. بیش از ۸۰ درصد شایسته‌های آبی در کمرندهای کوهزایی نوع اقیانوس آرام شکل می‌گیرد (شایسته آبی نوع B). ماهیت پروتولیت این نوع شایسته‌های آبی اقیانوسی است و شامل: توالی از توربیدایت، چرت لایه‌ای، بازالت نوع مورب و آهک‌های پلاژیک اقیانوسی بوده و طی فرورانش به مجموعه‌های فشار متوسط تا بالا تبدیل می‌شود. در حالی که شایسته‌های آبی محفوظ در نوارهای کوهزایی نوع برخورد قاره‌ای (شایسته‌های آبی نوع A) دارای پروتولیت پوسته قاره‌ای بوده و مجموعه‌های فشار بالا تا خیلی بالا را نشان می‌دهد (Maruyama *et al.*, 1996). به واسطه پوشش جنگلی انبوه، تمایز و شناسایی مرز واحدهای سنگی شایسته آبی متابازیتی و متاپلیتی با سرپانتینیت و

کلریتوئید و نبود کارفولیت بیانگر حداقل دمای ۳۵۰ درجه سانتیگراد بوده و همزیستی کلریتوئید و فنزیت نیز نشان‌دهنده حداقل فشار ۸ کیلوبار است.

همزیستی پاراژنز گارنت-کلریتوئید-فنزیت پروتولیت‌های متاپلیتی و سنگ‌های متابازیتی رخساره اکلوزیت و شایسته آبی در سرزمین‌های دگرگونی فشار بالا-دما پایین امری متداول است (Ghent *et al.*, Seidel and Okrusch, 1975). 1987

به طوری که Rötzler و همکاران (۱۹۹۸) فشار ۱۲ کیلوبار را برای میکاشیست‌های با پاراژنز گارنت+فنزیت+کلریتوئید به دست آورده‌اند. این میکاشیست‌ها سنگ‌های رخساره اکلوزیت توده بوهمین نوار کوهزایی واریسکن اروپای مرکزی را همراهی می‌کنند.

با توجه به حضور اسفن در شایسته‌های آبی متابازیتی و نبود ایلمنیت و روتیل در آنها و به استناد نمودار محدوده پایداری فازهای تیتانیم‌دار روتیل-ایلمنیت-اسفن (Liu *et al.*, 1996) فشار و دمای دگرگونی به ترتیب کمتر از ۱۲ کیلوبار و ۷۵۰ درجه سانتیگراد بوده است.

ج) **ترمومبارومترهای قراردادی:** مطابق ترمومتری گارنت-فنزیت (Krogh and Råheim, 1978) نیز دمای دگرگونی در فشار ۱۰ کیلوبار معادل ۴۵۰ تا ۵۵۰ درجه سانتیگراد است. یکی از روش‌های بارومتری قراردادی، استفاده از تعداد اتم‌های سیلیسیم موجود در ترکیب شیمیایی فنزیت (Massone and Schreyer, 1987) است

$$(P(Kb) = (4 \cdot \frac{Tc-260}{340}) + (Si - 3.1).25)$$


تعداد اتم‌های سیلیسیم موجود در ترکیب فنزیت کلریتوئید-گارنت شایسته‌ها از ۳/۳۷ تا ۳/۵ متغیر است که معادل فشار از ۹ تا ۱۲/۵ کیلوبار در دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد است.

شیست‌های سبز دربرگیرنده در مجموعه دگرگونی اسالم امکان‌پذیر نیست. پاراژنهای کانی‌شناسی شامل: اکتینولیت+ آلبیت+ اپیدوت+ کلریت در سنگ‌های رخساره شیست سبز و گلوکوفان+ اپیدوت+ آلبیت+ کلریت+ فنزیت در سنگ‌های رخساره شیست آبی مجموعه دگرگونی اسالم بیانگر پروتولیت متبازیتی آنها است. نتیجه تجزیه سنگ کل یکی از نمونه‌های شیست آبی نیز نشان‌دهنده میزان سیلیس ۴۸/۸ و مجموع آلکالن ۵/۵ درصد است (Saadat, 2013) که معادل ترکیب بازالتی است. Zanchetta و همکاران (۲۰۰۹) با مطالعه مجموعه دگرگونی شاندرمن (۵۰ کیلومتری جنوب شرق مجموعه دگرگونی اسالم) به وجود سنگ‌های رخساره اکلوزیت در این مجموعه دگرگونی پی برده‌اند و با بررسی شیمی اکلوزیت‌های شاندرمن و توده‌های نفوذی گابرویی تزریق شده در آن به این نتیجه رسیده‌اند که پروتولیت آنها اقیانوسی تا قاره‌ای بوده و معادل قوس آشفشانی قاره‌ای هستند. بر همین اساس، این پژوهشگران مجموعه دگرگونی شاندرمن را بخشی از پوسته قاره‌ای در نظر گرفتند. در حالی که، مطابق بررسی‌های Omrani و همکاران (۲۰۱۰) شیمی سنگ کل اکلوزیت و آمفیبولیت‌های شاندرمن از نوع اقیانوسی بوده و مشابه هر دو نوع مورب عادی و غنی شده است. با توجه به حضور گلوکوفان در مرکز پورفیروبلاست‌های گارنت‌اکلوزیت، Zanchetta و همکاران (۲۰۰۹) خاطر نشان کرده است که مسیر دگرگونی پیش‌رونده از رخساره شیست آبی عبور کرده است. با توجه به فاصله مکانی نزدیک و جایگاه زمین‌شناسی یکسان دو مجموعه دگرگونی اسالم و شاندرمن (Clark et al., 1975; Zanchetta et al., 2009; Zanchi et al., 2009) شاید سنگ‌های رخساره شیست آبی مجموعه دگرگونی اسالم، معادل سنگ‌های کم عمق‌تر پهنه فرورانش نسبت به

اکلوزیت‌های مجموعه دگرگونی شاندرمن باشد. در این رابطه، تعیین سن دگرگونی مجموعه اسالم ضروری است. نظر به این که بسته شدن پالئوتتیس و برخورد بلوک البرز و خرده قاره ایران مرکزی با حاشیه جنوبی اوراسیا (فاز کوهزایی ائوکیمرین) در تریاس بالایی انجام شده است (Zanchi et al., 2009)؛ در نتیجه، Zanchetta و همکاران (۲۰۰۹) با توجه به قدیمی‌تر بودن اکلوزیت‌های شاندرمن نسبت به فاز کوهزایی ائوکیمرین و ترکیب پروتولیت قاره‌ای آنها منشأ نبرجا را برای آنها در نظر گرفتند.

تنوع پروتولیت سنگ‌های مجموعه دگرگونی اسالم و شرایط فشار متوسط (شیست آبی اسالم) تا بالای دگرگونی (اکلوزیت شاندرمن) و عدم همراهی آنها با انواع واحدهای سنگی خیلی فشار بالای حاوی کوئزیت و الماس بیانگر آن است که این مجموعه دگرگونی می‌تواند ارایه کننده منشورهای بهم افزوده پهنه فرورانش (شیست آبی نوع B) و پوسته اقیانوسی فرورانده باشد که با شروع فرورانش لیتوسفر اقیانوسی پالئوتتیس به زیر حاشیه جنوبی اوراسیا (فاز کوهزایی هرسینین) به وجود آمده است (شکل ۵)؛ نه خاتمه فرورانش و برخورد بلوک البرز با اوراسیا (فاز کوهزایی ائوکیمرین).

حوضه اقیانوسی وسیع پالئوتتیس توجیه کننده اختلاف زمانی طولانی بین شروع فرورانش و تشکیل منشورهای بهم افزوده (کربونیفر بالایی) و خاتمه فرورانش و برخورد قاره-قاره (تریاس بالایی) است. در این رابطه بعضی از پژوهشگران نظیر: (Boulin, Berberian and King, 1981; Bagheri and Stampfli, 1988; Stampfli, 2000) نیز آغاز بسته شدن پالئوتتیس و فرورانش لیتوسفر اقیانوسی مرتبط با آن را که تقریباً همزمان با ریف‌تینگ نئوتتیس در بخش جنوبی بوده را کربونیفر بالایی در نظر گرفته است.



شکل ۵- مدل ژئودینامیکی محتمل برای تشکیل مجموعه دگرگونی اسالم (A) در شروع فروورانش پالتوتتیس (فاز کوهزایی هرسینین)، ضمن زایش حوضه اقیانوسی نئوتتیس و جدایش خرده قاره ایران مرکزی (CIMC) از حاشیه شمالی گندوانا (صفحه عربی)، منشورهای بهم افزوده متشکل از متابازیت (شیست سبز و شیست آبی)، متاپلیت و سرپانتینیت در زمان کربونیفر بالایی-پرمین در حال تشکیل بوده است. در منشورهای بهم افزوده و بخش‌های کم عمق کانال فروورانش مجموعه دگرگونی اسالم تشکیل شده و اسلب اقیانوسی فروورنده شده در اعماق بیشتر، سازنده اکلوتیت‌های مجموعه دگرگونی شاندرمن شده است؛ (B) - طی تریاس بالایی و انجام فاز کوهزایی ائوکیمرین، ضمن برخورد دو بلوک البرز (Al) و توران، جایگیری سنگ‌های دگرگونی در محل برخورد دو بلوک انجام شده است.

نتیجه‌گیری

سنگ‌های رخساره شیست آبی مجموعه دگرگونی اسالم از عوامل کلیدی مهم در بررسی فرآیند فروورانش و بسته شدن حوضه اقیانوسی پالتوتتیس و درک جایگاه تکتونیکی زمین‌درز پالتوتتیس، در پهنه برخوردی البرز است. در کنار منشأ نابرجا برای مجموعه دگرگونی اسالم که توسط بعضی از پژوهشگران خاطر نشان شده؛ برای خاستگاه این مجموعه دگرگونی سناریوی دیگری نیز به این صورت مطرح است که با توجه به شواهد سنگ‌شناسی، ژئوشیمیایی و محاسبات دما-فشارسنجی سنگ‌های رخساره شیست آبی، شاید مجموعه دگرگونی اسالم ارایه کننده رسوبات و قطعاتی از لیتوسفر اقیانوسی واقع در منشورهای بهم افزوده ناشی از شروع فروورانش صفحه اقیانوسی پالتوتتیس به زیر صفحه توران است که

در کربونیفر بالایی تحت تأثیر دگرگونی منطقه فروورانش قرار گرفته است.

سپاسگزاری

هزینه انجام این پژوهش از گرنت شماره ۳۸۷۱۰۸۹۲ معاونت پژوهشی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین تأمین اعتبار شده است. بنابراین، از آن معاونت محترم تشکر و قدردانی می‌نماییم. از آقای پروفسور فدریکو روزتی، از دانشگاه رم ایتالیا و دکتر توماس تی از دانشگاه اشتوتگارت آلمان که با انجام تجزیه‌های ریزکاو الکترونی سهم به سزایی در به ثمر رسیدن این پژوهش ایفا نمودند نیز کمال تشکر را داریم. در نهایت از داوران محترم مجله، که با ارایه نظرات و پیشنهادات ارزنده، به ارتقا علمی مقاله کمک نموده‌اند صمیمانه سپاسگزاریم.

منابع

- Agard, P., Labrousse, L., Elvevold, S. and Lepvrier, C. (2005) Discovery of Paleozoic Fe-Mg carpholite in Motalafjella, Svalbard Caledonides: a milestone for subduction-zone gradients. *Geology* 33: 761-764.
- Agard, P., Monie, P., Gerber, W., Omrani, J., Molinaro, M., Labrousse, L., Vrielynck, B., Meyer, B., Jolivet, L. and Yamato, P. (2006) Transient synobduction exhumation of Zagros blueschists inferred from pressure, temperature, deformation, time and kinematic constraints: Implications for Neotethys wedge dynamics. *Journal of Geophysical Researches* 111: B11401, doi:10.1029/2005JB004103.
- Alavi, M. (1991) Sedimentary and structural characteristics of the Paleotethys remnants in northeastern Iran. *Geological Society of America Bulletin* 103: 983-992.
- Alavi, M. (1996) Tectonostratigraphic synthesis and structural style of the Alborz mountain system in northern Iran. *Journal of Geodynamics* 21: 1-33.
- Alavi, M., Vaziri, H., Seyed-Emami, K. and Lasemi, Y. (1997) The Triassic and associated rocks of the Nakhlak and Aghdarband area in Central and northeastern Iran as remnants of the southern Turanian active continental margin. *Geological Society of America Bulletin* 109: 1563-1575.
- Asadian, O., Mirzaee, A. R. and Eftekharneshad, J. (1999) Geological map of Khalkhal-Rezvanshahr, 1/100000, No. 5765, Geological Survey of Iran, Tehran.
- Bagheri, S. and Stampfli, G. M. (2008) The Anarak, Jandaq and Posht-e-Badam metamorphic complex. *Tectonophysics* 451: 123-155.
- Baroz, J., Macaudiere, J., Montigny, R., Noghreyan, M., Ohnenstetter, M. and Rocci, G. A. (1983) Ophiolites and related formations in the Central part of the Sabzevar (Iran) and possible geotectonic reconstructions, geodynamic project (geotraverse) in Iran. Report no. 51, Geological Survey of Iran.
- Berberian, M. and King, G. C. P. (1981) Toward a paleogeography and tectonic evolution of Iran. *Canadian Journal of Earth Science* 18: 210-265.
- Boulin, J. (1988) Hercinian and Eocimerian events in Afghanistan and adjoining regions. *Tectonophysics* 148: 253-275.
- Bousquet, R., Goffe, B., Vidal, O., Oberhänsli, R. and Patriat, M. (2002) The tectono-metamorphic history of the Valaisan domain from the western to the Central Alps: new constraints on the evolution of the Alps. *Geological Society of America Bulletin* 114(2): 207-225.
- Clark, G. C., Davies, R. G., Hamzehpour, B. and Jones, C. R. (1975) Explanatory text of the Bandar-e-Pahlavi. Geological Quadrangle map 1/250000, No. D3, Geological Survey of Iran, Tehran.
- Coleman, R. G. and Lanphere, M. A. (1971) Distribution and age of high-grade blueschists, associated eclogites, and amphibolites from Oregon and California. *Geological Society of America Bulletin* 82: 2397-2412.
- Davies, R. G., Jones, C. R., Hamzehpour, B. and Clark, G. C. (1972) Geology of Masuleh, northwest Iran, sheet, 1:100,000, No. 24, Geological Survey of Iran, Tehran.
- Davoudian, A. R., Genser, J., Dachs, E. and Shabanian, N. (2008) Petrology of eclogites from north of Shahr-e-Kord, Sanandaj-Sirjan zone, Iran. *Mineralogy and Petrology* 92: 393-413.
- Delaloye, M. and Desmons, J. (1980) Ophiolites and mélange terrenees in Iran. A geochronological study and paleotectonic implications. *Tectonophysics* 68: 83-111.
- Ernest, W. G. (1971) Do mineral paragenesis reflect unusually high pressure conditions of Franciscan metamorphism. *American Journal of Sciences* 270: 81-108.
- Evans, W. E. (1990) Phase relations of epidote-blueschists. *Lithos* 25: 3-23.

- Fotoohi Rad, G. R., Droop, G. T. R., Amini, S. and Moazzen, M. (2005) Eclogites and blueschists of the Sistan suture zone, eastern Iran: a comparison of P-T histories from a subduction mélange. *Lithos* 84: 1-24.
- Frey, M., De Capitani C. and Liou, J. G. (1991) A new petrogenetic grid for low-grade metabasites. *Journal of Metamorphic Geology* 9: 479-509.
- Fursich, F. T., Wilmen, M., Seyed-Emami, K. and Majidi Fard, M. R. (2009) Lithostratigraphy of the Upper Triassic-Middle Jurassic Shemshak group of northern Iran. In: South Caspian to Central Iran Basins (Eds. Brunet, M. F., Wilmsen, M. and Granath, J. W.) Special publications 312: 129-160. Geological Society, London.
- Ghaseminejad, E., Aghanabati, A. and Dabiri, O. (2004) Late Triassic dinoflagellate cysts from the base of the Shemshak group in north of Alborz mountains, Iran. *Review of Palaeobotany and Palynology* 132: 207-217.
- Ghent, E., D., Stout, M., Z., Black, P., M. and Brothhers, R. N. (1987) Chloritoid-bearing rocks associated with blueschists and eclogites, northern New Caledonian. *Journal of Metamorphic Geology* 5: 239-254.
- Holland, T. J. B. (1983) The experimental determination of activities in disordered and short-range ordered jadeitic pyroxenes. *Contributions to Mineralogy and Petrology* 82: 214-220.
- Kretz, R. (1983) Symbols for rock-forming minerals. *American Mineralogist* 68: 277-279.
- Krogh, J. E. and Råheim, A. (1978) Temperature and pressure dependence of Fe-Mg partitioning between garnet and phengite, with particular reference to eclogites. *Contributions to Mineralogy and Petrology* 66: 75-80.
- Leake, B. E., Alan, R. W., William, D. B., Ernest, A. J. B., Giovanni, F., Jeol, D. J., Frank, C. H., Hanan, J. K., Vladimir, G. K., John, C. S., Nicholas, C. N. S. and Eric, J. W. W. (2004) Nomenclature of amphiboles: additions and revisions to the international mineralogical associations amphibole nomenclature. *American Mineralogist* 89: 883-887.
- Liu, J., Bohlen, S. R. and Ernest, W. G. (1996) Stability of hydrous phases in subducting oceanic crust. *Earth and Planetary Science Letters* 143: 161-171.
- Macaudière, J. (1983) Les roches métamorphiques au chaînon ophiolitique de Sabzevar-etude structural du domaine de Soltanabad (NE Iran). *Ofioliti* 8(1): 127-152.
- Maruyama, S. and Liou, J. G. (1998) Initiation of ultrahigh-pressure metamorphism and its significance on the Proterozoic-Phanerozoic boundary. *Island Arc* 7: 6-35.
- Maruyama, S. and Liou, J. G. (2005) From Snow ball to Phanerozoic earth. *International Geology Review* 47: 775-791.
- Maruyama, S., Cho, M. and Liou, J. G. (1986) Experimental investigations of blueschist-greenschist transition equilibria: pressure dependence of Al_2O_3 contents in sodic amphiboles -a new geobarometer. In: *Blueschists and Eclogites* (Eds. Evans, B. W. and Brown, E. H.) 164: 1-6. Geological Society of America, Memoir.
- Maruyama, S., Liou, J. G. and Terabayashi, M. (1996) Blueschists and eclogites of the world. *International Geology Review* 38: 485-594.
- Maruyama, S., Liou, J. G. and Terbayashi, M. (1998) Blueschists and eclogites of world and their exhumation. *International Geology Review* 38: 485-594.
- Massone, H. J., and Schreyer, W. (1987) Phengite geobarometry based on the limiting assemblage and K-feldspar, phlogopite, and quartz. *Contributions to Mineralogy and Petrology* 96: 212-214.
- Miyashiro, A. (1973) *Metamorphism and Metamorphic belts*. John Wiley & Sons, Inc., New York.

- Nabavi, M. H. (1976) An introduction to Iran geology. Geological Survey of Iran Publication, Tehran (in Persian).
- Nasrabady, M. (2009) Petrology of metamorphic rocks from ophiolitic belt of northern Sabzevar. PhD thesis, Tarbiat Moallem University, Tehran, Iran (in Persian).
- Nasrabady, M., Moinevaziri, H., Razavi, S. M. H. and Mohajjel, M. (2012) Mineralogy and thermobarometry of blueschists from Soltanabad metamorphic complex (NE Sabzevar). *Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy* 20(1): 123-140 (in Persian).
- Nori, F., Pormoafi, S. M., Lankarani, M. and Masoudi, F. (2012) Petrology and geochemistry of Masal-Shanderman metamorphic rocks (SW Bandar-e-Anzali). *Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy* 20(3): 429-440 (in Persian).
- Oberhänsli, R., Buosquet, R., Moinzadeh, H., Moazzen, M. and Arvin, M. (2007) The field of stability of blue jadeite: a new occurrence of jadeitite at Sarkhon, Iran as a case study. *Canadian Mineralogist* 45: 1501-1509.
- Okrusch, M., Seidel, E. and Davis, E. N. (1978) The assemblage jadeite-quartz in the glaucophane rocks of Sifnos Cyclades Archipelago, Greece. *Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlungen* 132: 284-308.
- Omran, H. (2010) Petrologic investigation of Shanderman eclogites (North Iran). PhD thesis, Tabriz University, Tabriz, Iran (in Persian).
- Omran, H., Moayyed, M., Oberhänsli, R., Bousquet, R. and Tsujimori, T. (2010) Geochemistry of the Shanderman eclogites: emphasis to their essence and protolith. *Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy* 18(3): 433-446 (in Persian).
- Omran, H., Moazzen, M., Oberhänsli, R., Altenberger, U. and Lange, M. (2013a) The Sabzevar blueschists of the north-Central Iranian micro-continent as remnants of the Neotethys-related oceanic crust subduction. *International Journal of Earth Sciences* 102(5): 1491-1512.
- Omran, H., Moazzen, M., Oberhänsli, R., Tsujimori, T., Bousquet, R. and Moayyed, M. (2013b) Metamorphic history of glaucophane-paragonite-zoisite eclogites from the Shanderman area, northern Iran. *Journal of Metamorphic Geology* 31: 791-812.
- Otsuki, M. and Banno, S. (1990) Prograde and retrograde metamorphism of hematite-bearing basic schists in the Sanbagawa belt in Central Shikoku. *Journal of Metamorphic Geology* 8: 425-439.
- Rötzler, K., Schumacher, R., Maresch, W. V. and Willner, A. P. (1998) Characterization and geodynamic implications of contrasting metamorphic evolution in juxtaposed high pressure units of the western Erzgebirge (Saxony, Germany). *European Journal of Mineralogy* 10: 261-280.
- Saadat, M. (2013) Petrology of Asalem metamorphic complex. MSc thesis, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran (in Persian).
- Sabzehi, M. (1974) Les mélanges ophiolitiques de la region de Esfandaghe (Iran meridional). etude petrologique et structural interpretation dans les carte Iranien. PhD thesis, University of Grenoble, Grenoble, France.
- Seidel, E. and Okrusch, M. (1975) Chloritoid-bearing metapelites associated with glaucophane rocks in western Crete, Greece. *Contributions to Mineralogy and Petrology* 49: 105-115.
- Sengör, A. M. C. (1984) The Cimmeride orogenic system and the tectonics of Eurasia. *Geological Society of America, Special Paper* 195: 1-82.
- Seyed-Emami, K. (2003) Triassic in Iran. *Facies* 48: 95-106.
- Stampfli, G. M. (2000) Tethyan oceans. In: *Tectonics and magmatism in Turkey and surrounding area* (Eds.

- Bozkurt, E., Winchester, G. A. and Piper, G. D. A.). special publication 1-23. Geological Society, London.
- Stöcklin, J. (1968) Structural history and tectonics of Iran, a review. American Association of Petroleum Geologist Bulletin 7: 1229-1258.
- Tirrul, R., Bell, I. R., Griffis, R. J. and Camp, V. E. (1983) The Sistan suture zone of eastern Iran. Geological Society of America Bulletin 94: 134-150.
- Torabi, G. (2011) Late Permian blueschist from Anarak ophiolite (Central Iran, Isfahan province), a mark of multi- suture closure of the Paleotethys ocean. Revista Mexicana de Ciencias Geologicas 28: 544-554.
- Zanchetta, S., Zanchi, A., Villa, I., Poli, S. and Muttoni, G. (2009) The Shanderman eclogites: a Late Carboniferous high-pressure event in the NW Talesh Mountains (NW Iran). In: South Caspian to Central Iran basins (Eds. Brunet, M. F., Wilmsen, M. and Granath, J. W.) special publications 312: 57-79. Geological Society, London.
- Zanchi, A., Zanchetta, S., Berra, F., Mattei, M., Garzanti, E. and Molyneux, S. (2009) The Eo-Cimmerian (Late? Triassic) orogeny in north Iran. In: South Caspian to Central Iran basins (Eds. Brunet, M. F., Wilmsen, M. and Granath, J. W.) Special publications 312: 31-55. Geological Society, London.

Thermobarometry and tectonic setting interpretation of blue schist facies rocks from the Asalem metamorphic complex (NW Rasht)

Mohammad Saadat, Mohsen Nasrabady * and Abbas Asiabanha Rezaei

Department of Geology, Faculty of Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

Abstract

A metamorphic complex containing green schist, mica schist and serpentinite exposed in the Asalem area (NW Rasht). The occurrence of blue schist facies rocks in this complex are reported here for the first time. Mineralogical paragenesis of metabasitic blueschists consists of glaucophane, epidote, chlorite and phengite while there are garnet, phengite, chloritoid and feldspar in the metapelitic rocks. The metamorphic conditions of these rocks calculated by THERMOCALC software, petrogenetic grids and conventional thermobarometers, are 7 to 12 Kb and 350 to 550 °C for pressure and temperature. Pressure and temperature conditions of metamorphism and protolith diversity (metapelite, marble, metabasite, serpentinite) of the Asalem metamorphic complex indicate that they were created in the Pacific Ocean-type accretionary prisms (B-type blueschists). The studied metamorphic complex likely originated along the Paleotethys suture zone, as a result of the subduction onset of the Paleotethys oceanic basin beneath the southern margin of Eurasia during Carboniferous.

Key words: Blueschist, Accretionary prisms, Paleotethys, Asalem metamorphic complex, Alborz

* nasrabadi@sci.ikiu.ac.ir