

استفاده از شواهد صحرایی، میکروسکوپی و ژئوشیمیایی در تعیین منشأ آنکلاوهای ماگمایی مجموعه پلوتونیک جبال بارز (شرق و شمال شرق جیرفت)

جمال رسولی^۱، منصور قربانی^{۱*} و وحید احدنژاد^۲

^۱ گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

^۲ گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران ۱۹۳۹۵-۴۶۹۷، ایران

چکیده

مجموعه پلوتونیک جبال بارز متشکل از چندین توده نفوذی گرانیتوئیدی است که در شرق و شمال شرق جیرفت در جنوب استان کرمان واقع شده‌اند. ترکیب سنگ‌شناسی این مجموعه شامل: گرانودیوریت، کوارتزیدیوریت، گرانیت و سینوگرانیت است. اما سنگ نفوذی غالب در این منطقه، گرانودیوریت است. این مجموعه گرانیتوئیدی، آنکلاوهای ماگمایی کروی و بیضوی با ترکیب مونزودیوریت، مونزودیوریت کوارتزار و دیوریت کوارتزار دارد. قطر این آنکلاوها از حدود چند میلی‌متر تا ۳۰ سانتی‌متر متغیر است. اندازه کانی‌های تشکیل‌دهنده آنکلاوها در قشر خارجی، ریزتر از مرکز آنکلاو است. دانه‌ریز بودن قشر خارجی آنکلاوها نشانه سرد شدن سریع مذاب سازنده آن در هنگام ورود به داخل ماگمای گرانیتوئیدی میزبان است. حضور آنکلاوهای ماگمایی به همراه شواهدی از حضور بافت‌های غیر تعادلی نظیر: فنوکریست فلدسپار با بافت‌های پویی کیلیتیک و آنتی‌پرتیت، خوردگی، تحلیل‌رفتگی و دگرسانی پلاژیوکلازها، حضور لخته‌های مافیک، آپاتیت‌های سوزنی، تیغه‌های پلاژیوکلاز کوچک درون پلاژیوکلازهای بزرگ‌تر و مرز مضرس و کنگره‌های زایده‌دار آنکلاو، همگی آمیختگی ماگمایی را تأیید می‌کنند. همچنین، پلاژیوکلازها زونینگ عادی و در برخی از موارد زونینگ نوسانی نشان می‌دهند که مؤید آمیختگی ماگمایی است. آنکلاوها و سنگ‌های میزبان آنها از لحاظ ژئوشیمیایی نیز با یکدیگر تفاوت‌های در خور توجهی نشان می‌دهند. به این صورت که آنکلاوها غنی از سدیم بوده و گرانودیوریت‌های میزبان از پتاسیم غنی هستند. علاوه بر این، آنکلاوها نسبت به گرانودیوریت‌های میزبان، از عناصر LILE و LREE تهی بوده و از عناصر HREE و Ti غنی هستند. بنابراین، به نظر می‌رسد این دو گروه سنگی شاید از دو ماگمای مختلف منشأ گرفته و در اثر فرآیند آمیختگی و اختلاط ماگمایی در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند. واژه‌های کلیدی: آمیختگی ماگمایی، آنکلاو ماگمایی، حاشیه فعال قاره‌ای، جبال بارز، پهنه ماگمایی ارومیه-دختر

مقدمه

بخش بزرگی از پوسته نواحی قاره‌ای کره زمین را به خود اختصاص داده و همواره مورد توجه

با توجه به اهمیت گرانیت به عنوان سنگی که

زمین‌شناسان قرار داشته است، باید از جنبه‌های متفاوت مطالعه شده و همه عوامل مؤثر در مطالعه دقیق آن در نظر گرفته شود. بررسی آنکلاوهای موجود در گرانیته‌ها، یکی از موضوعات مهم در مطالعه آنها است که حضور و دسترسی به آنها فرصت مناسبی را برای درک تحولات در مقیاس یک رخمون تا کل توده‌های نفوذی در یک منطقه ویژه را فراهم می‌کند. حضور آنکلاوها سال‌ها قبل برای نخستین بار توسط Hutton (۱۷۹۵) مورد توجه قرار گرفت و Lacroix (۱۸۹۳) مسیر این پژوهش را به روی دیگران گشود. در ادامه Barbarin و همکاران (۱۹۸۹) با انجام فعالیت‌های پی‌درپی در این زمینه، خود را به عنوان صاحب نظران آنکلاو مطرح نمودند. لزوم بررسی آنکلاوها به عنوان ابزاری در بررسی نحوه زایش و تحول مذاب‌های گرانیته‌ای و در کل، مطالعه تاریخچه تحولی سنگ میزبان گرانیته‌ای مهم است. اصولاً آمیزش ماگمای سنگ‌های آذرین فلسیک و بازیک در محیط‌های نفوذی و آتشفشانی که تحت عنوان پدیده اختلاط معروف است، سبب به وجود آمدن آنکلاوهای متنوعی می‌شود. گرانیته‌ها چندین نوع آنکلاوها را دربرمی‌گیرند که عبارتند از: زنولیت‌ها، سورمیکاسه‌ها، ماگمایی، کومولیت‌ها و آنکلاوهای مزدوج یا چند منشأیی، که تمرکز نگارندگان این پژوهش بر روی آنکلاوهای ماگمایی است (Didier Pabst, 1928; and Roques, 1958). مجموعه پلوتونیک جبال‌بارز متشکل از توده‌های نفوذی گرانیته‌ای است که در جنوب‌شرقی استان کرمان، بین طول‌های شرقی $57^{\circ}45'$ تا $58^{\circ}00'$ و عرض‌های شمالی $28^{\circ}30'$ تا $29^{\circ}00'$ واقع شده‌اند. ترکیب سنگ‌شناسی این توده‌ها شامل: کوارتزدیوریت، گرانودیوریت، گرانیته و آلکالی‌گرانیته است. اما سنگ غالب این توده‌ها، گرانودیوریت است. حضور

آنکلاوهای ماگمایی با اشکال و ابعاد متفاوت و ویژگی‌های ظاهری متمایز نسبت به یکدیگر و نسبت به سنگ میزبان، با توزیع فضایی ویژه در مجموعه پلوتونیک جبال‌بارز به وفور مشهود است. به طوری که بیشترین مقدار آنکلاوها در ناحیه میجان مشاهده شده و آنکلاوهای ماگمایی منطقه، در مشاهدات صحرایی دارای اشکال تقریباً تخم‌مرغی شکل بوده و حاشیه‌های کاملاً گرد شده دارند. همبری با سنگ میزبان تقریباً در همه جا کاملاً مشخص است (به غیر از آنکلاوهای فلسیک) و از لحاظ اندازه ابعاد، کاملاً متغیر هستند. در نهایت، آنها کاملاً ساختار آذرین داشته و در صحرای ساخت‌های سنگ‌های آذرین را نشان می‌دهند. در مجموعه مورد نظر، آنکلاوهای ماگمایی از نظر ویژگی‌های کانی‌شناسی و بافتی، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی را با گرانیته‌های میزبان نشان می‌دهند. همان طور که اشاره شد، مطالعه آنکلاوها در توده‌های گرانیته‌ای می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در مورد خاستگاه و ماهیت سنگ منشأ، چگونگی تحول و تکامل ماگمای مولد توده‌های نفوذی و بررسی احتمال وقوع اختلاط ماگمایی در اختیار پژوهشگران قرار دهد. با این که مجموعه پلوتونیک جبال‌بارز بزرگترین مجموعه نفوذی در پهنه ماگمایی ارومیه-دختر است، اما متأسفانه پژوهش‌های زمین‌شناسی بسیار اندک و انگشت شماری بر روی آن انجام شده است (Aletaha, 2004; Rasouli et al., 2014). همچنین، در همه توده‌های نفوذی تأخیری این مجموعه، به وفور می‌توان آنکلاوها را مشاهده کرد و این آنکلاوها دارای اشکال، رنگ‌ها و اندازه‌های مختلفی هستند و از لحاظ فیزیکی و ساختاری در بعضی از قسمت‌ها تفاوت بسیار زیادی با یکدیگر و سنگ میزبان نشان می‌دهند. همان طور که اشاره شد، سرگذشت آنکلاوها و بررسی ساختار و

خاستگاه آنها کمک در خور توجهی در تفسیرهای پترولوژیکی یک منطقه ماگمایی خواهد داشت. بنابراین، در پژوهش حاضر سعی شده است با استناد به نتایج حاصل از مشاهده روابط صحرایی، ویژگی‌های پتروگرافی، ژئوشیمی آنکلاوها و سنگ‌های گرانیتوئیدی میزبان، ضمن پژوهش در مورد وجود یا عدم وجود ارتباط ژنتیکی بین گرانیتوئیدها و آنکلاوها، منشأ و نحوه تشکیل آنکلاوهای ماگمایی مجموعه پلوتونیک جبال بارز نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

زمین‌شناسی منطقه

بر اساس تقسیم‌بندی ساختاری Darvishzadeh (۲۰۰۵) در مورد فلات ایران، منطقه مورد مطالعه در جنوب پهنه ماگمایی ارومیه-دختر قرار می‌گیرد. مجموعه پلوتونیک جبال بارز، از لحاظ مورفولوژی به شکل کوه‌های مرتفعی است که روند شمال غرب جنوب شرق داشته و توسط دره‌ها و آبراهه‌های عمیق بریده شده است (Aletaha, 2004). یک رخداد ماگمایی در دوره میوسن باعث نفوذ و جایگیری این مجموعه پلوتونیک چند مرحله‌ای در سنگ‌های ولکانیکی ائوسن شده است (Rasouli et al., 2014). فعالیت‌های آذرین در این منطقه در چهار مرحله رخ داده است (شکل ۱). نخستین مرحله ماگمایی مربوط به ژوراسیک بوده که پیامد آن تشکیل سنگ‌های گرانیتوئیدی است (اما به نظر نگارندگان این پژوهش، با استناد به مشاهدات صحرایی از قبیل: انطباق کامل مورفولوژی صحرایی این توده با سایر توده‌های نفوذی منطقه و همچنین، مهمترین شاهد در این قضیه وجود آپلیت‌های فراوان از این توده نفوذی در سنگ‌های پالئوسن و ائوسن منطقه که به خوبی در کنار جاده دلفارد به جیرفت مشاهده می‌شود، این


مرحله نیز متعلق به ترسیر است). دومین مرحله مربوط به مرحله ماگمایی ائوسن بوده که از نظر گسترش و فعالیت در منطقه مورد مطالعه از اهمیت چشمگیری برخوردار است (Rasouli et al., 2014). این مرحله ماگمایی به طور عمده دارای فعالیت خروجی بوده و سنگ‌های آن به طور عمده شامل: آندزیت و آندزی‌بازالت، ریوداسیت، ریولیت پورفیری و پیروکلاستیک‌های وابسته است. سنگ‌های مربوط به این مرحله در کل منطقه مورد مطالعه مشاهده می‌شود. سومین مرحله ماگمایی منطقه جبال بارز، مربوط به فعالیت ماگمایی الیگومیوسن است. این مرحله ماگمایی به طور گسترده در منطقه باعث تشکیل سنگ‌های نفوذی شده و همه مجموعه پلوتونیک جبال بارز، در این گروه قرار می‌گیرد. یعنی در زمان الیگومیوسن در منطقه، سه رخداد ماگمایی حادث شده است. نخستین رخداد شامل مجموعه پلوتونیک جبال بارز است که به طور عمده دارای ترکیب پتروگرافی کوارتز دیوریت تا دیوریت بوده و قسمت اصلی جبال بارز را می‌سازد. پس از یک فاصله زمانی کوتاه و تفریق ماگمای درون آشیانه ماگمایی، توده‌های پورفیری به درون این مجموعه پلوتونیک اصلی نفوذ نموده‌اند. ترکیب سنگ‌شناسی این توده‌ها به طور عمده دیوریت تا تونالیت است. این دسته از توده‌های پورفیری، رخداد دوم ماگمایی منطقه در طول الیگومیوسن هستند. به طور مجدد بعد از مدت زمانی کوتاه، آخرین رخداد ماگمایی الیگومیوسن (مرحله سوم) در منطقه حادث شده است. توده‌های نفوذی مرحله سوم الیگومیوسن که دارای ترکیب گرانیتی تا آلکالی گرانیتی یا کوارتزسینیت بوده، به درون توده‌های نفوذی قبلی تزریق شده‌اند. این دسته از سنگ‌های منطقه مورد مطالعه (سنگ‌های مرحله سوم الیگومیوسن)، از تفریق ماگمای رخداد اول

الیگومیوسن) به وجود آمده‌اند. چهارمین مرحله ماگمایی منطقه مورد مطالعه، مربوط به بازالت‌های کواترنری است. البته این سنگ‌ها در منطقه مورد مطالعه بسیار محدود و اندک هستند (Rasouli *et al.*, 2014).

روش انجام پژوهش

مطالعه آنکلاوهای ماگمایی مجموعه پلوتونیک جبال بارز در دو بخش صحرایی و آزمایشگاهی انجام شد. در بخش صحرایی با توجه به تغییرات سنگ‌شناسی و ویژگی‌های فیزیکی نظیر: رنگ و ابعاد کانی‌های سازنده، تعداد ۲۰۰ نمونه از سنگ‌های نفوذی و آنکلاوها برداشت شد. شناسایی

ویژگی‌های اصلی سنگ‌شناسی شامل: ویژگی‌های بافتی و ترکیب کانی‌شناسی با تکیه بر روش‌های پتروگرافی و با میکروسکوپ پلاریزان در دانشگاه شهید بهشتی انجام شد. سپس تعداد ۱۵ نمونه از سنگ‌های سالم برای انجام تجزیه شیمیایی عناصر اصلی، کمیاب و نادر خاکی انتخاب شدند. عناصر اصلی با روش XRF و عناصر کمیاب با روش ICP-MS در آزمایشگاه ژئوشیمی دانشگاه Perugia کشور ایتالیا تجزیه شدند. نتایج این تجزیه‌ها در جدول‌های ۱ و ۲ مشاهده می‌شود. سپس داده‌ها توسط نرم‌افزارهای تخصصی سنگ‌شناسی از قبیل: Petrograph مورد تحلیل و پردازش قرار گرفت که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.



شکل ۱- نقشه زمین‌شناسی کمپلکس گرانیتوئیدی جبال بارز (بر گرفته از نقشه زمین‌شناسی نماشیر، سبزواری و بزم با تصحیحات و نقشه ایران برگرفته از Honarmand و همکاران (۲۰۱۲)).

جدول ۱- داده‌های XRF آنکلاوها و میزبان گرانیتیویدی آنها در منطقه جبال بارز (داده‌ها بر حسب درصد وزنی هستند) (نمونه‌هایی که با علامت * مشخص شده‌اند، مربوط به آنکلاوها است).

samples	Petrography	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	MgO	TiO ₂	MnO	P ₂ O ₅	L0I	Total
91JB175*	Quartz diorite	49.35	16.58	10.4	8.65	3.65	0.9	5.48	0.66	0.26	0.16	2.96	98.99
91JB163*	Granodiorite	55.24	14.35	8.85	8.69	2.37	2	2.77	0.56	0.15	0.08	3.49	98.5
91JB40*	Quartz diorite	54.79	17.65	8.75	7.35	4.13	0.8	3.54	0.86	0.17	0.15	0.94	99.13
91JB132	Monzo Quartz diorite	66.02	15.65	4.68	4.39	3.95	2.5	1.54	0.38	0.19	0.13	0.42	99.8
91JB56*	Granodiorite	59.12	16.57	6.8	6.98	3.57	1.4	3.02	0.69	0.14	0.09	1.29	99.64
91JB145*	Granodiorite	59.89	15.96	8.69	3.79	4.31	2.4	2.24	0.67	0.38	0.09	0.67	99.08
91JB85	Granite	70.01	14.86	2.69	3.6	4.01	2.2	1.4	0.33	0.07	0.04	0.69	99.91
91JB100	Monzo granite	72.54	13.95	1.93	2.48	3.97	3.1	0.83	0.21	0.08	0.03	0.48	99.55
91JB143	Alkali granite	75.98	13.54	0.53	0.62	3.88	4.7	0.04	0.01	0.01	0.01	0.49	99.82
91JB137	Alkali granite	76.02	13.28	0.7	0.7	4.11	4.2	0.1	0.06	0.02	0.01	0.2	99.41
91JB128	Alkali granite	76.27	13.4	0.85	0.82	4.16	4	0.1	0.03	0.09	0	0.07	99.74
91JB2*	Diorite	47.45	15.96	10	11	1.65	0.7	9.3	0.75	0.25	0.14	0.75	97.91
91JB6	Alkali granite	74.52	14.15	0.74	3.13	5.62	0.2	0.53	0.32	0	0.08	0.45	99.69
91JB10	Sino-Granite	70.52	16.16	0.8	4	6	0.2	0.71	0.38	0	0.13	0.69	99.63
91JB29	Sino-Granite	72.22	14.25	2.85	2.23	3.63	3.4	0.56	0.23	0.08	0.07	0.3	99.84

جدول ۲- داده‌های ICP-MS آنکلاوها و میزبان گرانیتیویدی آنها (داده‌ها بر حسب قسمت در میلیون).

samp le	91JB17 5*	91JB16 3*	91JB4 0*	91JB1 32	91JB5 6*	91JB14 5*	91JB 85	91JB1 00	91JB1 43	91JB1 37	91JB1 28	91JB 2*	91JB 6	91JB 10	91JB 29
Sc	33.50	22.66	30.31	16.79	28.29	23.59	14.81	13.56	13.20	12.50	13.57	48.04	8.08	7.07	5.05
V	218.04	128.02	220.78	59.57	174.60	129.18	67.90	35.16	8.69	8.78	10.54	276.3 0	34.0 3	52.05	18.01
Cr	245.44	44.48	25.08	16.50	30.33	0	27.53	144.39	14.42	16.27	106.10	282.3 0	4.04	4.04	4.04
Co	9.56	16.17	20.21	9.26	17.26	12.81	8.57	5.74	1.04	1.54	2.96	32.03	0.80	0.80	3.60
Ni	30.72	13.57	11.19	1.72	10.15	4.20	12.44	16.69	7.44	3	16.62	56.05	4.04	4.04	2.02
Ga	15.33	11.33	14.76	12.97	13	13.79	12.3	9.81	15.03	14.67	15.43	11.81	7.80	8.60	15.01
Rb	57.22	68.23	20.67	96.79	48.53	159.81	116.6 6	141.78	231.61	253.23	179.60	21.72	1.80	1.80	107.1 0
Sr	736.28	309.19	379.09	340.7	403.5	171.11	293.6 4	208.60	32.23	52.78	74.53	265.3 0	160. 20	213.2 0	149.1 4
Y	24.05	27.34	29.54	29.41	26.60	67.14	11.52	8.55	50.61	13.95	24.72	15.51	26.5 2	15.21	27.62
Zr	89.22	142.06	140.86	122.40	121.40	132.75	103.1 0	92.64	74.25	65.35	50.15	20.02	5.05	4.04	10.01
Nb	4.67	6.39	4.40	8.45	3.80	13.83	4.98	4.75	17.60	8.20	10.38	2.02	5.05	3.03	9.509 5
Cs	2.22	1.41	0.54	3.31	1.75	10.30	4.47	4.28	1.38	2.57	1.88	2.02	0.50	0.40	1.701 7
Ba	413.15	302.44	100.59	358.60	201.90	478.98	220.3 6	323.06	96.74	226.93	403.10	133.1 0	43.2 4	59.65	434.4 3
La	20.91	19.10	12.90	19.23	11.44	12.48	9.25	16.64	12.99	36.65	17.98	9.09	8.08	9.09	20.02
Ce	43.88	43.23	33.62	42.64	27.27	35.74	20.88	30.35	33.87	72.29	41.15	19.01	11.5 1	11.01	47.04
Pr	5.10	5.07	4.70	4.96	3.54	5.76	2.21	2.69	3.49	5.99	3.91	2.43	1.70	1.53	5.70
Nd	20.41	19.73	21.03	20.43	15.54	29.58	8.72	8.87	14.05	19.29	14.55	10.31	8.08	6.95	20.22
Sm	4.75	4.58	5.62	4.81	4.20	9.27	1.96	1.55	4.19	2.72	3.43	2.60	2.55	1.90	4.10
Eu	1.37	1	1.38	1.05	1.05	1.03	0.59	0.44	0.14	0.25	0.33	0.85	0.45	0.60	0.80
Gd	4.09	4.19	4.99	4.25	3.84	8.54	1.73	1.35	4.47	2.33	2.90	2.60	3.03	2.02	3.80
Tb	0.74	0.79	0.91	0.75	0.74	1.72	0.32	0.22	1.01	0.35	0.55	0.42	0.66	0.40	0.70
Dy	4.04	4.51	5.21	4.68	4.34	11.15	1.79	1.24	7.12	2.07	3.66	2.60	4.01	2.34	4.20

یتروگرافی

گرانودیوریت: در صحرای دارای دگرسانی گسترده بوده و حالت تپه ماهوری دارد. کانی‌های اصلی آن به طور متوسط عبارتند از: پلاژیوکلاز (۵۸ درصد)، کوارتز (۲۵ درصد)، فلدسپار آلکالن (۷ درصد)، بیوتیت (۵ درصد) و آمفیبول (۳ درصد) (درصد کانی‌های اصلی با روش چشمی اندازه‌گیری شده و نسبی است). پلاژیوکلاز بارزترین کانی گرانودیوریت‌ها است. این کانی دارای ماکل‌های پلی‌سنتتیک (شکل ۲-B) و پری‌کلین و نیز خاموشی است. با اندازه‌گیری زاویه خاموشی و با کمک روش میشل‌لوی، نوع آن آندزین تا لابرادوریت تشخیص داده شده است (مقدار زاویه خاموشی بین ۲۰ تا ۲۹). برخی از پلاژیوکلازها، به سریسیت تجزیه شده‌اند (شکل ۲-C). کوارتز به صورت نیمه شکل‌دار و با ابعاد دانه متوسط دیده شده و در بیشتر موارد به صورت بین‌دانه‌ای است. فلدسپار آلکالن از نوع اورتوز بوده و برخی از بلورهای آن به کانی‌های رسی و

در بررسی‌های صحرایی و مطالعه ۲۰۰ مقطع نازک از سنگ‌های کمپلکس گرانیتوئیدی جبال بارز مشخص شد که ترکیب سنگ‌شناسی این توده‌ها شامل: کوارتز دیوریت، گرانودیوریت، گرانیت و آلكالی گرانیت است. با توجه به مشاهدات صحرایی به نظر می‌رسد نخستین مرحله تزریقی که در سراسر منطقه جبال بارز مشاهده می‌شود، بیشتر ترکیب کوارتز دیوریت تا گرانودیوریت دارد. سنگ‌های مرحله دوم دانه درشت‌تر از مرحله یک بوده و بیشتر گرانودیوریت تا گرانیت را شامل می‌شود. در صحرا با حرکت از مرحله یک به طرف مرحله سه، فلسیک شدن سنگ‌ها بیشتر می‌شود. به این صورت که سنگ‌های مرحله سوم را بیشتر آلكالی گرانیت‌ها تشکیل داده و در سنگ‌های این مرحله، حضور کانی‌های مافیک به شدت کاهش می‌یابد.

کوارتز دیوریت: در صحرا به دلیل فراوانی کانی‌های مافیک و اپاک (شکل ۲-A) تیره‌تر از سایر سنگ‌های کمپلکس گرانیوتوئیدی جبال بارز دیده می‌شود. کانی‌های اصلی این سنگ عبارتند از: پلاژیوکلاز (۵۲ درصد)، کوارتز (۱۴ درصد)، فلدسپار آلکالن (۵ درصد)، آمفیبول (۸ درصد) و بیوتیت (۵ درصد). برخی بلورهای فلدسپار آلکالن به سرسیت و کانی‌های رسی تجزیه شده‌اند. کوارتز به صورت بلورهای بی‌شکل با ابعاد دانه ریز







استفاده از روش میشل لوی، در محدوده الیگوکلاز است (مقدار زاویه خاموشی بین سه تا نه متغیر است). بیوتیت بی شکل تا نیمه شکل دار و دانه متوسط با تغییر رنگی از زرد روشن تا سبز تیره دیده شده و در برخی از مقاطع دگرسانی به کلریت (شکل ۲-F) را نشان می دهد.

آنکلاوهای ماگمایی: بررسی های صحرایی نشان داد که آنکلاوهای ماگمایی در همه کمپلکس گرانیتوئیدی جبال بارز به ویژه در منطقه میجان از فراوانی زیادی برخوردار هستند. در مشاهدات صحرایی، آنکلاوها دارای شکل های تقریباً تخم مرغی (شکل ۳-A و ۳-B) بوده و حاشیه های کاملاً گرد شده دارند. مرز آنها با سنگ میزبان تقریباً در همه جا واضح بوده (به غیر از آنکلاوهای فلسیک (شکل ۳-C)) و هیچگونه نشانه دگرگونی دیده نمی شود. همچنین، از لحاظ اندازه ابعاد، کاملاً متغیر بوده و از چند سانتی متر تا چند ده سانتی متر (شکل ۳-D) در تغییر هستند و در صحرای ساخت های سنگ های آذرین را نشان می دهند (شکل ۳-E). بر اساس مشاهدات صحرایی (شکل، رنگ، بافت، ریخت شناسی مرز آنها با سنگ میزبان) و مطالعات میکروسکوپی، آنکلاوهای ماگمایی در کمپلکس گرانیتوئیدی جبال بارز به دو نوع تقسیم می شوند: الف) فلسیک و ب) مافییک. آنکلاوهای فلسیک بر خلاف آنکلاوهای مافییک، ترکیب کانی شناسی (گرانودیوریتی تا مونزو-سینوگرانیتی)، شیمیایی و بافتی هماهنگ با سنگ میزبان داشته و اغلب آنها مرز واضحی با میزبان نشان نمی دهند. آنکلاوهای فلسیک شکل خاصی نداشته و بیشتر در حاشیه بخش های گرانودیوریتی دیده می شوند. تشکیل آنکلاوهای فلسیک، به گسیختگی در حاشیه سریع متبلور شده توده، در اثر فشار ناشی از تزریق های متوالی مذاب، نسبت داده شده است.

سریسیت تجزیه شده اند. آمفیبول فراوان ترین کانی مافییک موجود در گرانودیوریت ها است. آمفیبول به صورت بلورهای نیمه شکل دار تا بی شکل با ابعاد دانه متوسط تا ریز یافت شده و دگرسانی به بیوتیت را نشان می دهد.

گرانیت: در صحرای دارای مورفولوژی زبر و خشن است. کانی های اصلی در گرانیت های کمپلکس جبال بارز شامل: کوارتز (۳۵ درصد)، پلاژیوکلاز (۲۴ درصد)، فلدسپار آلکالن (۲۱ درصد) و بیوتیت (۴ درصد) است (شکل ۲-D). کوارتز به صورت نیمه شکل دار تا بی شکل با ابعاد دانه متوسط تا دانه ریز دیده می شود. پلاژیوکلازها شکل دار تا نیمه شکل دار و با ابعاد دانه درشت دیده شده و برخی از پلاژیوکلازها در اثر دگرسانی سریسیتی شده اند. همچنین، برخی از پلاژیوکلازها دارای ماکل پلی سنتتیک و برخی نیز دارای زونینگ هستند (شکل ۲-E). فلدسپار آلکالن در گرانیت های کمپلکس جبال بارز، بیشتر اورتوز بوده و اغلب به صورت بی شکل تا نیمه شکل دار با ابعاد دانه متوسط دیده می شود. بیوتیت به صورت ورقه ای شکل با تغییر رنگ از قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره دیده می شود.

سینوگرانیت: دارای بافت گرانولار با دانه های درشت بوده و کانی های اصلی آن شامل: آلکالی فلدسپار (۴۰ درصد)، کوارتز (۳۰ درصد)، پلاژیوکلاز (۱۳ درصد) و آمفیبول (۶ درصد) است. آلکالی فلدسپار بی شکل تا نیمه شکل دار بوده و به صورت بافت گرانوفیریک در متن سنگ دیده می شود. کوارتز به طور عمده نیمه شکل دار تا بی شکل دیده شده و به صورت تک دانه یا مجتمع، فضای خالی بین کانی های دیگر را اشغال کرده است. پلاژیوکلاز با ماکل پلی سنتتیک در سنگ دیده شده و ترکیب شیمیایی آن با توجه به اندازه گیری های به عمل آمده زاویه خاموشی و



شکل ۲- A) فراوانی کانی‌های مافیک و اپاک در کوارتز دیوریت جبال بارز؛ B) ماکل پلی‌سنتتیک در گرانودیوریت؛ C) دگرسانی بلورهای پلاژیوکلاز به سریسیت و اپیدوت در گرانودیوریت؛ D) نمایی از گرانیتهای منطقه مورد مطالعه با بلورهای فراوان کوارتز؛ E) بافت زونینگ در گرانیتهای دگرسانی بیوتیت به کلریت در سینوگرانیت (Opq = کانی‌های اپاک؛ Pl = پلاژیوکلاز؛ Sr = سریسیت؛ Q = کوارتز؛ Bio = بیوتیت؛ Chl = کلریت و Alf = آلکالی‌فلدسپار) (همه شکل‌ها در نور پلاریزه متقاطع است).

اعتقاد بر این است که آنکلاوهای فلسیک به حالت جامد (زینولیت ماگمایی) در مذابی از جنس خود جای گرفته‌اند (Donaire et al., 2005). اغلب این آنکلاوها از لحاظ کانی‌های اصلی تفاوت چندانی با میزبان خود نداشته و تنها نسبت حجمی متفاوتی از کانی‌های میزبان را در خود جای داده‌اند. معمولاً نسبت به سنگ میزبان از کانی‌های مافیک غنی‌تر هستند و این تفاوت اندک در ترکیب شیمیایی سنگ کل آنها بازتاب دارد (Barbarin and Bateman, 1983; Noyes et al., 1986; Didier and Barbarin, 1987; Barbarin et al., 1989). برای مثال: مقادیر اکسیدهای CaO ، Fe_2O_3 ، MgO و MnO در آنکلاوهای فلسیک بیشتر از سنگ میزبان گرانیتوئیدی است (جدول ۱). آنکلاوهای ریزدانه مافیک، در بخش‌های حاشیه‌ای تا بخش‌های درونی‌تر سنگ میزبان گرانیتوئیدی حضور دارند. ماگمای منشأ آنکلاوهای ماگمایی مافیک از لحاظ گرانیروی با ماگمای میزبان تفاوت در خور توجهی دارد.

این آنکلاوها بر خلاف آنکلاوهای فلسیک، اشکال متنوع کروی، بیضوی و عدسی‌شکل دارند. آنکلاوهای مافیک عدسی‌شکل در بخش‌های حاشیه‌ای توده نسبت به بخش‌های درونی‌تر آن طویل‌شدگی بیشتری داشته اما نسبت محور طولی به محور عرضی ظاهری از پنج تجاوز نمی‌کند. آنکلاوهای مافیک مرز مشخصی با سنگ میزبان داشته و در مشاهدات میکروسکوپی با حرکت از سمت آنکلاو به سمت سنگ میزبان (فاصله گرفتن از مرز سنگ میزبان با آنکلاو مافیک)، در محدوده میزبان، اندازه بلورها افزوده می‌شود. در مرز بین آنکلاو و سنگ میزبان، جهت‌یافتگی کانی‌های بیوتیت و پلاژیوکلاز و انحراف (کج‌شدگی)، جدایش و کنده شدن برخی درشت بلورهای سنگ

میزبان (مانند پلاژیوکلاز) و حضور آنها در داخل آنکلاو در خور توجه بوده و این نشان از حضور آنکلاو و میزبان به حالت مذاب یا نیمه مذاب در کنار هم است (Silva et al., 2000). فرضیه پایه در بررسی منشأ ماگمایی برای آنکلاوها، حضور آنها به صورت گلبول، حباب یا بسته‌های ماگمایی در ماگمای میزبان است که ویژگی‌هایی همچون: اشکال کروی، آرایش موازی قاب‌ها و بلورهای کشیده کانی‌ها در مرز بین آنکلاو و میزبان، مرز کاملاً مشخص بین آنها در نمونه دستی و مقاطع میکروسکوپی، تأیید کننده این موضوع است (Kumar et al., 2004; Silva et al., 2000). مشاهدات صحرایی و بررسی شکل‌های آنکلاوها و مرز آنکلاو و سنگ میزبان نشان می‌دهد که شاید اختلاف گرانیروی مناسبی بین این دو وجود داشته و اشکال کروی و بیضوی محصول این اختلاف باشد. زیرا تشکیل مرز محدب بین آنکلاو و میزبان، نیازمند مقاومت مذاب منشأ آنکلاو در برابر تنش‌های هیدروستاتیک و جهت‌دار وارد شده از طرف ماگمای محاط کننده است و نیروی مقاوم، گرانیروی بالاتر مذاب آنکلاو در سطح تماسی است که در اثر مجاورت با ماگمای میزبان به طور ناگهانی سرد شده است و به این ترتیب پوسته‌ای مقاوم با ویسکوزیته‌ای بالاتر از جنس ماگمای آنکلاو باعث ایجاد سطح تماس محدب می‌شود (Blake and Fink, 2000). شکل آنکلاوها در حاشیه توده کشیده بوده و به سمت درون توده به شکل کروی یا بدون شکل تغییر می‌کند که این رخداد از جمله شواهد رخداد جریان ماگمایی و حضور این آنکلاوها به صورت بسته‌های ماگمایی در ماگمای گرانیتی است. آنکلاوهای ماگمایی در همه جای توده گسترده بوده و افزون بر آنکلاوهای ماگمایی، زینولیت‌های آتشفشانی از جنس آندزیت‌بازالت (شکل ۳-F) که محصول آمیختگی

شده‌اند که با حرکت به بخش‌های مرکزی‌تر توده از فراوانی آنها کاسته می‌شود.

واحدهای آتشفشانی مجاور توسط ماگمای نفوذی میزبان هستند، نیز در حاشیه توده به وفور دیده



شکل ۳- A و B) آنکلاوهای ریزدانه مافیک که تخم‌مرغی شکل بوده و مرز کاملاً مشخص با سنگ میزبان خود در منطقه جبال‌بارز دارند؛ C) آنکلاو ریزدانه فلسیک که به سختی از میزبان خود قابل تشخیص است؛ D) آنکلاوی با ابعاد بزرگ (بیش از ۲۰ سانتی‌متر)؛ E) آنکلاوی که دارای مرز کاملاً واضح با سنگ میزبان بوده و دارای ساختار آذرین است و F) زینولیت‌هایی با جنس آندزیت‌بازالت از سنگ میزبان که در سنگ گرانودیوریتی مشاهده می‌شود.

مشاهدات میکروسکوپی آنکلاوها: همان طور

که اشاره شد آنکلاوهای ماگمایی فلسیک از لحاظ کانی‌شناسی، با میزبان خود هماهنگ بوده و شامل: گرانودیوریت تا سینو-مونزوگرانیت هستند. کانی‌های موجود در آنها شامل: کوارتز، پلاژیوکلاز، آلکالی‌فلدسپار، بیوتیت، آپاتیت و اسفن است. در مشاهدات میکروسکوپی برخی از آنکلاوهای فلسیک، مرز مشخصی بین آنکلاو و سنگ میزبان وجود ندارد (شکل ۴-۱) و نوعی آمیختگی بین آنها دیده می‌شود. عدم وجود مرز قابل تشخیص بین آنکلاو فلسیک و سنگ میزبان گرانیتوئیدی در مشاهدات صحرایی، بازتاب وضعیت یاد شده در مقیاسی بزرگ‌تر نیز محسوب می‌شود. اما آنکلاوهای مافیک از لحاظ درصد کانی‌های اصلی، با سنگ میزبان متفاوت بوده و ترکیب سنگ‌شناسی آنها شامل: مونزودیوریت، مونزودیوریت کوارتزار و دیوریت کوارتزار است. اگر مقایسه‌ای از لحاظ کانی‌شناسی بین آنکلاوهای مافیک و سنگ میزبان انجام شود، مشخص می‌شود که کانی‌های اصلی سنگ میزبان، کوارتز، پلاژیوکلاز و آلکالی‌فلدسپار است (همان طور که در قسمت پتروگرافی سنگ میزبان مفصل تشریح شد) و کانی‌های فرعی و مافیک آنها اغلب بیوتیت و در برخی موارد آمفیبول است. در حالی که کانی‌های اصلی آنکلاوهای مافیک، پلاژیوکلاز، آمفیبول و حتی گاهی پیروکسن است و کانی‌هایی مانند: کوارتز و آلکالی‌فلدسپار دارای مقادیر اندکی بوده و گاهی کانی فرعی محسوب می‌شود. بنابراین، آنکلاوهای مافیک مقادیر مختلفی از کانی‌های کوارتز، پلاژیوکلاز، فلدسپار آلکالن (اورتوکلاز-میکروکلین)، هورنبلند سبز، پیروکسن، بیوتیت، آپاتیت و کانی‌های اپاک را در خود جای داده‌اند (Barbarin et al., 1989). سوزن‌های آپاتیت به صورت میانبار در بیوتیت (شکل ۳-۱) و

فلدسپارها به فراوانی دیده می‌شوند.

در آنکلاوهای مافیک، بافت پیویی‌کیلیتیکی (شکل ۳-۱)، آنتی‌پرتیت (شکل ۴-۱) و پلاژیوکلازهای دارای زونینگ، میکروپرتیت و کوارتزهای رگچه‌ای تجدید تبلور یافته (شکل ۴-۱) حضور دارند. در بیشتر آنکلاوها، دگرسانی‌های پتاسیک و سدیک همگام با میزبان انجام شده است. تشکیل بیوتیت ثانویه، کلریت، سربیسیت، اسفن، اکسیدهای آهن و روتیل به وقوع این نوع دگرسانی‌ها در کانی‌های اولیه مانند: هورنبلند سبز، بیوتیت، پلاژیوکلاز و اورتوکلاز و رهایی عناصر Ca, Fe, K, Mg و Na و انتقال برخی از آنها (عناصر متحرک) به وسیله سیال‌های ماگمایی یا جوی مربوط است (شکل ۴-۱، E و F). شکل‌های متنوعی در آنکلاوهای مافیک دیده می‌شود که تنوع این اشکال در قالب دو تفسیر کلی ممکن است. الف) اشکال کروی، بیضوی و دوکی در آنکلاوهای مافیک (شکل ۳-۱ و C) در میزبانی که فاقد هر گونه جهت‌یافتگی یا شواهد تأثیر تنش بر مجموعه آنکلاو-میزبان در ابعاد نمونه دستی و رخنمون صحرایی باشد و علایم تغییر شکل پلاستیک حالت جامد در مقیاس میکروسکوپی در آنها دیده نمی‌شود، به جریان ماگمایی و تقابل دو مذاب با ماهیت شیمیایی و رئولوژیکی متفاوت نسبت داده شده است (Silva et al., 2000; Vernon, 2000; Kumar and Rino, 2006).

به عقیده بسیاری از پژوهشگران، جهت‌یافتگی بارز کانی‌هایی مثل: بیوتیت و پلاژیوکلاز و چرخش، جدایش و کنده شدن برخی درشت بلورهای میزبان (پلاژیوکلاز) در مرز آنکلاو-میزبان به حضور آنکلاو و میزبان به صورت مذاب یا نیمه جامد در کنار هم و در واقع به حضور آنکلاوها به صورت بسته‌ها یا گلبول‌هایی از ماگمای مافیک درون ماگمای فلسیک میزبان اشاره دارد (Silva et

Kumar and Rino, Vernon, 2000; *al.*, 2000 (2006).

به علاوه، آرایش خطی تجمعات پلاژیوکلاز و بیوتیت در مرز آنکلاو-میزبان و انحراف و جدایش درشت بلورهای میزبان در منطقه مرزی و رشد کانی‌های سازنده آنکلاو در کنار هم، شواهد جریان ماگمایی بوده و وجود مرز بارز در مقیاس میکروسکوپی نیز تأییدی بر اختلاف گرانیروی مذاب منشأ آنها نسبت به هم است (Paterson *et al.*, 1989؛ Vernon, 2000؛ Blake and Fink, 2000).

موارد بیان شده در توجیه اشکال مشاهده شده از آنکلاوها، تنها بخشی از عوامل تأثیر گذار بوده و می‌توان عواملی مانند: مدت زمان همزیستی بین بسته‌ها یا گلوله‌های ماگمای مافیک منشأ آنکلاوها با ماگمای میزبان و اختلاف دمایی بین این بسته‌ها با مذاب فلسیک و وضعیت رئولوژیکی ماگمای هیبرید را نیز به آن اضافه نمود. (ب) آنکلاوهایی که در سنگ‌های میزبان اندکی جهت یافته و دگرریخت حضور دارند و طویل‌شدگی اندکی در سنگ میزبان نشان می‌دهند (شکل ۳-D). با وجود این که در صحرا به دلیل ریز بلور بودن، جهت‌یافتگی بارزی نشان نمی‌دهند، در مقیاس میکروسکوپی شواهد تغییر شکل در حالت جامد و تأثیر تنش بر آنها آشکار است. کوارتزهای دوباره تبلور یافته منفرد و رگه‌ای با خاموشی موجی (شکل ۴-D)، خردشدگی در حاشیه درشت بلورهای کوارتز و فلدسپار، هم‌رشدی میرمکیتی در پلاژیوکلازها و تغییر شکل پلاستیک در هورنبلند سبز و بیوتیت، بیانگر عملکرد تنش بر مجموعه آنکلاو-میزبان بوده و عامل ایجاد تغییر شکل (طویل‌شدگی) در آنکلاوها همگام با ایجاد تغییر شکل پلاستیک در سنگ میزبان است. همچنین، مشاهده آثار تغییر شکل پلاستیک در آنکلاوهایی طویل شده‌ای که در مقیاس میکروسکوپی شواهد

جریان ماگمایی را نشان می‌دهند و در میزبان جهت یافته حضور دارند را می‌توان به تحمیل تغییر شکل حالت جامد بر جریان ماگمایی نسبت داد که در مشاهدات صحرایی و در سنگ میزبان، خود را به صورت جهت‌یافتگی اندکی (شبیه به برگوارگی) و در آنکلاو (مقیاس میکروسکوپی) به صورت حاشیه‌های مضرس نشان می‌دهد (Vernon, 2000). وجود رگه‌های کوارتزی و کوارتزهای طویل شده در این آنکلاوها که بین بلورهای اولیه و درشت‌تر فلدسپار و هورنبلند سبز محصور شده‌اند، بیانگر حضور سیالات ماگمایی در مراحل اولیه دگرریختی بوده و نشانه حالت نیمه مذاب آنکلاو در این زمان است.


شیمی آنکلاوهای ماگمایی و سنگ میزبان:

بررسی نتایج تجزیه شیمیایی و نمودارهای رسم شده، تمایز بارز بین روندهای مشاهده شده از آنکلاوهای ماگمایی مافیک و سنگ‌های میزبان و شباهت‌های عمده بین آنکلاوهای فلسیک و میزبان را نشان می‌دهد. مقادیر اکسیدهای CaO ، FeO(t) ، MgO و TiO_2 در آنکلاوها نسبت به سنگ میزبان بالاتر بوده و مقادیر SiO_2 در میزبان بیشتر از آنکلاو است. در حالی که مقادیر اکسیدهای Na_2O و K_2O (شکل ۵) بین میزبان و آنکلاو تقریباً همسان است. همچنین، روند نزولی تغییرات عناصر کمیاب در نمودارهای این عناصر در مقابل SiO_2 (شکل ۶) و روندهای خطی در الگو تغییرات اکسیدهای CaO ، FeO(t) و MgO و پراکنندگی الگوهای اکسیدهای Na_2O و K_2O نشان‌دهنده اختلاط ماگمایی است. در نهایت می‌توان گفت که شباهت الگوی نمودار عنکبوتی سنگ میزبان و آنکلاوها (شکل ۷) وقوع پدیده آمیختگی ماگمایی و هم‌گن‌شدگی ترکیبی بین ماگمای میزبان و آنکلاوهای ماگمایی را تأیید می‌کند (Donaire *et al.*, 2005؛ Yilmaz, 2005). افزون بر این، در


مافیک آنکلاوهای ماگمایی است (Kumar and Rino, 2006).

آنکلاوهای ماگمایی دارای ماهیت متآلومین هستند. در مقابل نمونه‌های سنگ میزبان، متآلومین و پرآلومین است (شکل ۸).


بررسی عناصر کمیاب مشخص شد که بین عناصر Ni و Cr با SiO_2 و Fe_2O_3 در آنکلاوها همبستگی وجود داشته و شیب تغییرات آنها منفی است. کاهش پیش‌رونده عناصر Co، Cr و V از آنکلاو به سنگ میزبان با افزایش SiO_2 ، نشانه‌ای برای منشأ



شکل ۴- A) آنکلاو فلسیک در سنگ‌های جبال بارز که از لحاظ کانی‌شناسی تفاوت زیادی با میزبان خود نداشته و دارای کانی‌های ریزتری است و با حرکت از مرز به طرف سنگ میزبان، به اندازه کانی‌ها افزوده می‌شود؛ B) بافت آنتی‌پرتیت و حضور پلاژیوکلاز دارای زونینگ؛ C) حضور گسترده آپاتیت‌های سوزنی به صورت میانبار در بیوتیت و بافت پوپی کلیتیک؛ D) حضور گسترده کانی‌های ثانویه به ویژه کوارتز و تشکیل رگچه‌های دگرسانی؛ E) دگرسانی بیوتیت به کلریت؛ F) مگاکریست‌های پلاژیوکلاز و آلکالی‌فلدسپار در حال دگرسانی به سرپیسیت، اپیدوت و سایر کانی‌های رسی.




شکل ۵- نمودارهای دو متغیره تغییرات عناصر اصلی در برابر افزایش SiO₂ در آنکلاوها و سنگ میزبان جبال بارز.




شکل ۶- نمودارهای نشان دهنده تغییرات عناصر کمیاب در برابر افزایش SiO₂ در آنکلاو و سنگ میزبان جبال بارز (Harker, 1909). روند نزولی تغییرات عناصر واندادیوم و کبالت در این نمودارها، مبین پدیده اختلاط ماگمایی بین دو قطب فلسیک و مافیک است (Yilmaz, 2005؛ Donaire et al., 2005).

هماهنگی الگوی تغییرات اکسیدهای عناصر اصلی در آنکلاوهای فلسیک و روند تغییرات در سنگ میزبان در برابر SiO_2 در کنار قرابت‌های کانی‌شناختی و توزیع مکانی آنها در سنگ میزبان موجب شده تا آنها به گسیختگی‌های احتمالی در بخش‌های حاشیه‌ای توده نفوذی طی مراحل مختلف تزریق ماگمایی نسبت داده شوند (Donaire et al., 2005).

ماهیت متاآلومین-پرآلومین میزبان با حضور آنکلاوهای مافیک در آنها سازگار است. زیرا تجربه نشان داده که بیشتر توده‌های نفوذی متاآلومین-پر آلومین دارای آنکلاوهایی هستند که اختلاف ژئوشیمیایی بارزی با سنگ میزبان خود نشان داده و محصول تقابل ماگمای گوشته‌ای و مذاب پوسته‌ای هستند (Arslan and Bonin, 1990; Aslan, 2006).



شکل ۷- نمودارهای عنکبوتی آنکلاوها و سنگ میزبان برای سنگ‌های گرانیتوئیدی کمپلکس جبال بارز. (A) نمونه‌های سنگ میزبان نرمالیز شده با MORB؛ (B) نمونه‌های آنکلاو نرمالیز شده با MORB؛ (C) کل نمونه‌های سنگ میزبان و آنکلاوها نرمالیز شده با گوشته اولیه؛ (D) کل نمونه‌های سنگ میزبان و آنکلاوها نرمالیز شده با کندریت.



شکل ۸- نمودار Shand (۱۹۴۳) برای آنکلاو و سنگ‌های میزبان منطقه جبال بارز.

بحث

آنکلاوها به صورت جامد یا مذاب به درون ماگمای میزبان وارد می‌شوند. ممکن است بخشی از سنگ میزبان یا بخشی از مواد تفریق یافته اولیه هم منشأ با ماگمای میزبان یا بقایای ذوب نشده حاصل از فرآیند آناتکسی (رستیت)، طی صعود یا جایگزینی ماگما به درون آن وارد شوند. اگر آنکلاو به صورت مذاب به داخل ماگمای گرانیتوئیدی وارد شده باشد، ممکن است با ماگمای میزبان خود هم منشأ یا از منشأهای مختلفی مشتق شده باشد. وجود آنکلاوهای مافیک کاملاً گرد شده، عدم ارتباط بین پراکندگی آنکلاوها با حاشیه توده نفوذی و آثاری از بروز تبادلات شیمیایی یا کانی‌شناسی بین آنکلاو و سنگ میزبان همگی دلایلی بر علیه فرضیه منشأگیری آنکلاوها از فرآیند شکسته شدن سنگ‌های میزبان است. زیرا در صورت خرد شدن سنگ‌های میزبان و راهیابی آنها به داخل ماگما، انتظار می‌رود آنکلاوها در نزدیک حاشیه فراوان‌تر و زاویه‌دار بوده و در عین حال هیچگونه تبادلات شیمیایی و کانی‌شناسی در آنها انجام نشده باشد (Chen et al., 2002؛ Dorais et al., 1997). وجود آنکلاوهای گرد شده، عدم مشاهده حاشیه انجماد سریع مافیک و فقدان تمرکز آنکلاوها فقط در حاشیه توده نفوذی، بیانگر آن است که آنکلاو نمی‌تواند حاصل حاشیه انجماد سریع توده نفوذی باشد. منشأ ماگمایی آنکلاو با بافت‌های بارز آذرین مانند: وجود بلورهای شکل‌دار فازهای مافیک و پلاژیوکلاز با بافت پورفیروئید، ماکل و زونینگ پلاژیوکلازها مشخص می‌شود (Vernon, Liankun and Kuirong, 1991). وجود اختلاف ژئوشیمیایی بین آنکلاوهای مافیک و توده گرانیتوئیدی، منشأ اتولیتی آنکلاوها را با تردید مواجه می‌سازد. زیرا در صورت اتولیتی

بودن آنکلاوهای مافیک انتظار می‌رود که ویژگی‌های ژئوشیمیایی توده و آنکلاوها مشابه باشد (Fershtater and Borodina, 1991). در بررسی‌های Chappell (۱۹۹۶) و Dorais و همکاران (۱۹۹۷) مشخص شد که فقدان بافت کومولایی در آنکلاوها و بالا نبودن عناصر کروم (۱۰۰ قسمت در میلیون)، نیکل (۲۰ قسمت در میلیون) و استرانسیوم (۳۷۰ قسمت در میلیون) و حضور کوارتز در ترکیب آنکلاوها، با فرضیه کومولا بودن آنها منافات دارد. همچنین، اختلاف ژئوشیمیایی بین آنکلاو مافیک و سنگ میزبان نیز دلیلی بر منتفی دانستن شکل‌گیری آنکلاوها از حاشیه انجماد سریع توده نفوذی است. ویژگی‌های ژئوشیمیایی متفاوت آنکلاوهای مافیک با سنگ میزبان و مقادیر پایین عناصر دیرگداز در آنکلاوها، احتمال رستیت بودن آنها را نیز با تردید مواجه می‌سازد (Liankun and Kuirong, 1991). از طرف دیگر، فقدان بافت‌های دگرگونی و عدم ظهور آنومالی مثبت Eu در آنکلاوها، با رستیت بودن آنها منافات دارد (Sergi, 1997). محتمل‌ترین منشأ برای تشکیل آنکلاوهای ماگمایی کمپلکس گرانیتوئیدی جبال‌بارز، راهیابی مذاب دیوریتی به مخزن ماگمای سازنده گرانیتوئیدها است. به این صورت که ماگمای حد واسط-بازیک پر حرارت به درون ماگمای اسیدی به نسبت سردتر نفوذ کرده و با از دست دادن دما به آنکلاو تبدیل شده و در برابر مذاب پیرامون خود نفوذناپذیر باقی‌مانده است (Stephens et al., 1991). دانه‌ریز بودن آنکلاوها به عنوان شاهی از سرد شدن سریع مذاب سازنده آنها در مقایسه با ماگمای گرانیتوئیدی تفسیر می‌شود (Donaire et al., 2005). به عقیده Vernon (۱۹۸۳) ورود قطرات ماگمایی حد واسط دمای بالاتر به درون ماگمای فلسیک سردتر، باعث

از پژوهشگران، حضور لخته‌های مافیک بیوتیت و هورنبلند به همراه اسفن و کانی‌های اپاک را یکی از آثار بارز وقوع اختلاط ماگمایی قلمداد می‌کنند (Baxter and Barbarin and Didier, 1992; Feely, 2002). همچنین، بسیاری از پژوهشگران، حضور مگاکریست فلدسپار پتاسیم در آنکلاو را نشانه وقوع اختلاط ماگمایی می‌دانند (Elburg, 1996; Perugini *et al.*, 2003). با توجه به این واقعیت که ترکیب شیمیایی بیشتر آنکلاوها برای تبلور درشت بلورهای فلدسپار پتاسیم مناسب نیست، پس باید مواد لازم برای تبلور مگاکریست‌های این کانی از منشأ خارجی تأمین شده باشد (Vernon, 1991). به عقیده Vernon (۱۹۹۱) مگاکریست‌های فلدسپار پتاسیم در آنکلاو و سنگ میزبان از یک منشأ هستند. منشأ عناصر مورد نیاز برای تبلور فنوکریست‌های فلدسپار پتاسیم، ماگمای سازنده سنگ میزبان است (Vernon, 1991; Baxter and Feely, 2002). بنابر نظریه Castro و همکاران (۱۹۹۱) اغلب مگاکریست‌ها در آنکلاوها، شاید زنوکریست‌های متبلور شده در ماگمای سیلیسی میزبان بوده که توسط ماگمای سازنده آنکلاو به دام افتاده‌اند. Baxter و Feely (۲۰۰۲) وجود فنوکریست‌های فلدسپار پتاسیم را شاهدهی بر تبلور فلدسپار پتاسیم در هنگام انتقال مکانیکی تلقی می‌کنند. علاوه بر این، با توجه به تمرکز درشت بلورها در نزدیکی مرز آنکلاو-سنگ میزبان، به نظر می‌رسد این بلورها از سنگ میزبان مشتق شده و موجب تغییر ترکیب شیمیایی آنکلاو به سمت مونزودیوریت شده باشد (Bussy, 1990). بنا بر پیشنهاد Bussy (۱۹۹۰) بلورهای فلدسپار پتاسیم به محض قرارگیری در محیط جدیدی که دمای بیشتری دارد ناپایدار شده و به طور موضعی از سطوح خارجی و به ندرت از درون دستخوش

سرعت بخشیدن به انجماد ماگمای حد واسط، افزایش نرخ هسته‌سازی و به دنبال آن تشکیل بافت میکروگرانولار می‌شود. همین امر باعث شده که با نزدیک شدن به محل همبری آنکلاو-سنگ میزبان، به دلیل افزایش نرخ سردشدگی، اندازه بلورها نسبت به مرکز آنکلاو، کوچک‌تر باشد (Kumar, 1995; Vernon, 1983). وجود مرز مضرس و زایده‌دار بین آنکلاو-سنگ میزبان در مقیاس میکروسکوپی، بیانگر مذاب بودن آنکلاو در هنگام قرارگیری در مخزن ماگمایی و دلیلی بر اختلاط ماگمایی تلقی می‌شود (Barbarin and Chen El Desouky *et al.*, 1996; Didier, 1991; Kumar *et al.*, 2004). به علاوه بنا بر پیشنهاد برخی از پژوهشگران، بیوتیتی که توسط آمفیبول احاطه شده است، از شواهد اختلاط ماگمایی محسوب می‌شود. بلورهای بیوتیت دارای ادخال‌های آپاتیت سوزنی‌شکل هستند که شاید بر اثر فوق اشباع شدن موضعی یا اختلاط ماگمایی به وجود آمده باشند (Frost and Karsli *et al.*, 1995; Mahood, 1987; Salonsaari, 2007). به هر حال بسیاری از پژوهشگران، انکلوزیون‌های آپاتیت سوزنی را بلورهای ماگمایی اولیه در نظر گرفته و احتمال رستیت بودن آنها را در گرانیتوئیدها ناچیز می‌دانند (Chappell *et al.*, 1987; Bacon, 1989; Chen *et al.*, 1997). Dorais *et al.*, 1997). بالا بودن میزان Fe_2O_3 ، TiO_2 و MnO ، MgO در آنکلاوها در مقایسه با سنگ میزبان، ناشی از فراوانی کانی‌های فرومنیزین آمفیبول، بیوتیت و اکسیدهای آهن و تیتان بوده و میزان بالاتر CaO و Al_2O_3 به فراوانی پلاژیوکلاز در آنکلاو نسبت داده می‌شود (Barbarin, 2005). فراوانی آپاتیت در آنکلاو به اشباع شدن ماگما از P_2O_5 و تبلور سریع آن نسبت داده می‌شود (Kumar, 1995). به علاوه، بسیاری

انحلال می‌شود. در این حالت، حفرات حاصل از انحلال ممکن است با مواد زمینه آنکلاو پر شوند. وی حضور درشت بلور فلدسپار پتاسیم با حاشیه انحلالی در آنکلاو را دلیلی بر اختلاط ماگمایی تلقی می‌کند. علاوه بر این، پایین بودن عناصر Ba، K_2O و Rb در ماگمای سازنده آنکلاو نسبت به سنگ میزبان، باعث محدودیت در تبلور فلدسپار پتاسیم شده است. زمانی که ماگمای حدواسط فاقد بلور به درون ماگمای اندکی متبلور شده اسیدی نفوذ کند، به دلیل این که قبلاً مقداری از پتاسیم ماگمای اسیدی به دلیل تبلور بخشی، به درون شبکه کانی‌ها وارد شده و با کمبود پتاسیم مواجه است؛ بنابراین، مقداری از پتاسیم ماگمای حد واسط به درون ماگمای اسیدی انتشار یافته و با این عمل میزان پتاسیم ماگمای آنکلاو کاهش می‌یابد (Sergi, 1997). علاوه بر این، بافت‌های دیگری که دلالت بر فرآیند اختلاط ماگمایی دارند نیز در نمونه‌ها یافت می‌شوند که از آن جمله می‌توان پلاژیوکلاز تیغه‌ای کوچک درون پلاژیوکلاز بزرگ‌تر و به طور کلی، حضور بلورهای سوزنی حاصل از انجماد سریع ماگمای مافیک یا حد واسط اشاره نمود (Hibbard, 1991؛ Akal and Helvaci, 1999؛ Arslan and Aslan, 2006). از سوی دیگر، ممکن است فراوانی بالای Na_2O و فراوانی اندک K_2O در آنکلاو به متفاوت بودن منشأ یا شرایط تشکیل دو ماگما مرتبط باشد. به عبارتی ممکن است آنکلاو در محیطی متفاوت یا در فشار H_2O بالاتر تشکیل شده باشد. در پی تزریق ماگمای حد واسط به بخش تحتانی یک مخزن ماگمای گرانیتوئیدی و ورود قطرات کانی‌های مافیک به داخل مخزن، تعادل حرارتی مخزن به هم خورده و فرآیند انتشار باعث تغییر ترکیب شیمیایی ماگما خواهد شد. به طوری که آنکلاوها از عناصری مانند: HREE، Nb، Sm و Y

غنی و از عناصری مانند: Ba و Rb تهی می‌شوند (Tindle, 1991). فراوانی تقریباً برابر عناصر Cr، Co و Ni در دو ماگما بیانگر این است که سنگ‌های توده نفوذی نمی‌توانند از کانی‌های مافیک سازنده آنکلاو مشتق شده باشند یا این که آنکلاو بخش انجماد سریع و زود تبلور یافته توده نفوذی باشد. زیرا این عناصر در طول تفریق یا ذوب بخشی به شدت تهی می‌شود. میزان انتقال عناصر بین دو ماگمای سازنده آنکلاو و سنگ میزبان به وضوح تابع اندازه آنکلاوها است. آنکلاوهایی با اندازه ۸ تا ۱۰ سانتی‌متر، مرز منظمی با سنگ میزبان داشته، دانه‌ریزتر بوده و به ترکیبات دیوریتی متمایل می‌شوند. در حالی که آنکلاوهای با ابعاد بیش از ۲۰ سانتی‌متر، شکل‌های زاویه‌داری داشته، دانه درشت‌تر بوده و بیشتر کوارتز دیوریتی و مونزودیوریتی هستند. آنکلاوهای کوچک در مقایسه با انواع درشت‌تر، سریع‌تر سرد شده و در نتیجه سیستم تقریباً بسته‌ای را نسبت به غنی‌شدگی از عناصر آल्کالی، REE، LILE و HFSE تشکیل داده‌اند (Barbarin and Didier, 1992). تاکنون الگوهای متفاوتی درباره محیط ژئودینامیکی ماگماتیسم پهنه ارومیه-دختر رایج شده است. عده‌ای از پژوهشگران به الگوی ریفیت درون قاره‌ای برای ماگماتیسم در این پهنه ماگمایی معتقد هستند (Amidi and Majidi, 1977؛ Caillet et al., 1978؛ Emami, 1981؛ Sabzehei, 1994) و بعضی دیگر از پژوهشگران، فرورائش لیتوسفر اقیانوسی نئوتتیس به زیر ایران مرکزی را دلیلی برای رخداد ماگماتیسم در این پهنه می‌دانند (Berberian and Berberian, 1972؛ Takin, 1981؛ Moinevaziri, 1985؛ Aftabi and Atapour, 2000). به طور کلی، داده‌های ژئوشیمیایی موجود نشان می‌دهند که ماگماتیسم

کوارتز دیوریت، گرانودیوریت، گرانیت و سینوگرانیت، میزبان آنکلاوهای ماگمایی مافیک با جنس مونزونیتی، مونزودیوریتی و دیوریتی کوارتزار و فلسیک با ترکیب گرانیت و سینوگرانیت است. مطالعات صحرایی، پتروگرافی و ژئوشیمیایی آنکلاوهای ماگمایی و سنگ میزبان نشان از اختلاط ماگمایی دارد. آنکلاوهای این منطقه بیشتر کروی بوده و اندازه آنها از چند میلی‌متر تا ۳۰ سانتی‌متر متغیر است. مرز آنها با گرانودیوریت‌های میزبان در مقیاس نمونه دستی غالباً مشخص و در مقیاس میکروسکوپی کنگره‌ای و زائیده‌دار است. ویژگی‌های متفاوت ژئوشیمیایی آنکلاوها با سنگ میزبان نشان می‌دهد که ماگمای سازنده آنکلاوها و سنگ‌های میزبان از دو منشأ متفاوت بوده و به دلیل تفاوت‌های فیزیکی و شیمیایی زیاد، نتوانسته‌اند به طور کامل با یکدیگر اختلاط کرده و از این رو قطرات کانی‌های کم حجم مافیک به شکل حباب‌هایی درون ماگمای اصلی فلسیک پراکنده شده و تشکیل آنکلاوها را داده است.

سپاسگزاری

تجزیه‌های این پژوهش با همکاری و راهنمایی‌های ارزنده پروفیسور Poli در دانشگاه Perugia ایتالیا انجام شد. به این سبب نگارندگان بر خود لازم می‌دانند مراتب تشکر و قدردانی خود را از ایشان مبذول دارند.

نفوذی کمپلکس گرانیتوئیدی جبال بارز ناشی از فرورانش بوده و این منطقه، حاشیه فعال قاره‌ای است (Rasouli, 2015). بنابراین، می‌توان گفت که کمپلکس نفوذی یاد شده، از جمله توده‌های نفوذی کم عمقی محسوب می‌شود که در ترازهای فوقانی پوخته جایگزین شده است. در توده‌های نفوذی کم عمق، معمولاً حجم ماگمای اسیدی بیشتر از ماگمای مافیک و حد واسط است. بنابراین، در اثر اختلاط آنها، کانی‌های مافیک به صورت حباب‌هایی درون ماگمای فلسیک پراکنده می‌شوند (Sparks and Marshal, Vernon, 1983). به عقیده Barbarin (۲۰۰۵) در صورتی که ماگمای مافیک و حد واسط قبل از تبلور ماگمای فلسیک به درون آن نفوذ کرده باشد اختلاط ماگمایی انجام می‌شود. در حالی که اگر بعد از تبلور بخشی ماگمای فلسیک با آن مواجه شود، به دلیل افزایش ویسکوزیته ماگمای میزبان، به شکل حباب‌هایی (آنکلاوهای) درون آن پراکنده می‌شود.

نتیجه‌گیری

آنکلاوهای ماگمایی کمپلکس گرانیتوئیدی جبال بارز به دو دسته فلسیک و مافیک تقسیم می‌شوند. البته در حواشی توده زینولیت‌هایی از جنس سنگ میزبان ولکانیکی نیز مشاهده می‌شود. کمپلکس گرانیتوئیدی جبال بارز، با ترکیب

منابع

- Aftabi, A. and Atapour, H. (2000) Regional aspects of shoshonitic volcanism in Iran. Episodes 164 (2): 119-124.
- Akal, C. and Helvacı, C. (1999) Mafic micro granular enclaves in the Kozak Granodiorite, western Anatolia. Journal of Asian Earth Sciences 176(8): 1-17.
- Aletaha, B. (2004) Petrography and petrology of igneous rocks and associated copper mineralization in south-east Bam. PhD thesis, Islamic Azad University, Tehran, Iran (in Persian).
- Amidi, M. and Majidi, B. (1977) Geological Quadrangle Map of Iran, Hamadan, 1:250000, No. D6,

Geological Survey of Iran, Tehran.

- Arslan, M. and Aslan, Z. (2006) Mineralogy, petrography and whole-rock geochemistry of the Tertiary granitic intrusion in eastern Pontides, Turkey. *Journal of Asian Earth Sciences* 125(27): 177-193.
- Barbarin, B. and Bateman, P. C. (1986) Origin and evolution of mafic magmatic enclaves and mafic rocks associated with some granitoids of the Central Sierra Nevada. 14th International Mineralogical Association Meeting, Stanford, California. USA.
- Barbarin, B., Dodge, F. C. W., Kistler, R. W. and Bateman, P. C. (1989) Mafic inclusions and associated aggregates and dikes in granitoid rocks, Central Sierra Nevada batholith. *Analytic Data*, U. S. Geological Survey, Bulletin.
- Barbarin, B. and Didier, J. (1991) Conclusions. In: *Enclaves and granite petrology* (Eds. Didier, J. and Barbarin, B.) 545-549. Elsevier, Amsterdam.
- Barbarin, B. and Didier, J. (1992) Genesis and evolution of mafic micro granular enclaves through various types of interaction between coexisting felsic and mafic magmas. *Earth Sciences Journal* 83 (2): 145-153.
- Barbarin, B. (2005) Mafic magmatic enclaves and mafic rocks associated with some granitoids of the central Sierra Nevada batholith, California: nature, origin and relations with the hosts. *Lithos* 80(3): 155-177.
- Bacon, C. R. (1989) Crystallization of accessory phases in magmas by local saturation adjacent to phenocrysts. *Geochimica et Cosmochimica Acta* 53(2): 1055-1066.
- Berberian, F. and Berberian, M. (1981) Tectono-plutonic episodes in Iran. In: *Zagros, Hindu Kush and Himalaya geodynamic evolution*, Am. American Geophysical Union Geodynamics Series 3: 5-32.
- Blake, S. and Fink, J. H. (2000) On the deformation and freezing of enclaves during magma mixing. *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 95(4):1-8.
- Bonin, B. (1990) From orogenic and anorogenic setting: evolution of granitoid suites after a major orogenesis. *Geological Journal* 25(2): 261-270.
- Baxter, S. and Feely, M. (2002) Magma mixing and mingling textures in granitoids: examples from the Galway granite, Connemara, Ireland. *Mineralogy and Petrology* 76(3): 63-74.
- Bussy, F. (1990) The rapakivi texture of feldspars in the plutonic mixing environment: a dissolution-recrystallization process. *Geological Journal* 25(4): 319-324.
- Castro, A. I., Moreno-Ventas, J. D. and De La Rosa, H. J. (1991) Multistage crystallization of tonalitic enclaves in granitoids rocks (Hercinian Belt, Spain): implications for magma mixing. *Geologische Rundschau* 80(2): 109-120.
- Caillet, C., Dehlavi, P. and Martel-Jantin, B. (1978) *Géologie de la région de Saveh (Iran) contribution à l'étude du volcanisme et du plutonisme Tertiaires de la zone de l'Iran Central: thèse de doctorat*, Université Grenoble, Grenoble, France.
- Chappell, B. W. (1996) Magma mixing and the production of compositional variation within granite suites: evidence from the granites of southeastern Australia. *Journal of Petrology* 37(3): 449-470.
- Chappell, B., White, A. J. R. and Wyborn, D. (1987) The importance of residual source material (restite) in granite petrogenesis. *Journal of Petrology* 28(2): 1111-1138.
- Chen, Y. D., Price, R. C. and White A. J. R. (1989) Inclusions in three S-type granites from southeastern Australia. *Journal of Petrology* 30(3): 1181-1218.
- Chen, Y. D., Jahn, B. M. and Wei, C. (2002) Petrogenesis of Mesozoic granitoids in the Dabie UHP complex, Central China: trace element and Nd-Sr isotope evidence. *Lithos*. 60(4): 67-88.

- Darvishzadeh, A. (2005) *Geology of Iran*. Amirkabir Publication, Tehran (in Persian).
- Dorais, M. J., Lira, R., Chen, Y. and Tingey, D. (1997) Origin of biotite-apatite-rich enclaves, Achala batholith, Argentina. *Contribution to Mineralogy and Petrology* 130(2): 31-46.
- Donaire, T., Pascual, E., Pin, C. and Duthou, J. L. (2005) Microgranular enclaves as evidence of rapid cooling in granitoid rocks: the case of the Los Pedroches granodiorite, Iberian massif, Spain. *Contribution to Mineralogy and Petrology* 149(2): 247-265.
- Didier, J. and Barbarin, B. (1987) The different types of enclaves in granites-nomenclature. In: *Enclaves and granite petrology, developments in petrology* (Eds. Didier, J. and Barbarin, B.) 19-24. Elsevier, Amsterdam.
- Didier, J. and Roques, M. (1958) Sur les enclaves des granites du massif Central Francais. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences Paris* 228: 1830-1841.
- El Desouky, M., Feely, M. and Mohr, P. (1996) Diorite-granite magma mingling and mixing along the axis of the Galway granite batholith, Ireland. *Journal of the Geological Society* 153(2): 361-374.
- Elburg, M. A. (1996) U-Pb ages and morphologies of zircon in microgranitoid enclaves and peraluminous host granites: evidence for magma mingling. *Contribution to Mineralogy and Petrology* 123(2): 177-189.
- Emami, M. H. (1981) *Géologie de la région de Qom-Aran (Iran): contribution à l'étude dynamique et géochimique du volcanisme Tertiaire de l'Iran Central: thèse de doctorat, Université Grénoble, Grénoble, France*.
- Fershtater, G. B. and Borodina, N. S. (1991) Enclave in the Hercynian granitoids of the Urals mountains, U. S. S. R. In: *Enclaves and granite petrology* (Eds. Didier, J. and Barbarin, B.) 132(1): 83-94. Elsevier, Amsterdam.
- Frost, T. P. and Mahood, G. A. (1987) Field, chemical and physical constraints on mafic-felsic magma interaction in the Lamark granodiorite, Sierra Nevada, California. *Geological Society of America Bulletin* 99(2): 272-291.
- Harker, A. (1909) *The natural history of igneous rocks*. Methneu Publication, London.
- Hibbard, N. J. (1991) Textural anatomy of twelve magmamixed granitoid systems. In: *Enclaves and granite petrology* (Eds. Didier, J. and Barbarin, B.) 167(3): 431-441. Elsevier, Amsterdam.
- Honarmand, M., Ranjbar, H. and Shahabpour, J. (2012) Application of principal component analysis and spectral angle mapper in the mapping of hydrothermal alteration in the Jebal-Barez area, southeastern Iran. *Resource Geology* 62(2): 119-139.
- Hutton, J. (1795) *The theory of the earth*. Edinburgh, Methneu Publication, London.
- Karsli, O., Chen, B., Aydin, F. and Şen, C. (2007) Geochemical and Sr-Nd-Pb isotopic compositions of the Eocene Dölek and Sariçiçek plutons, eastern Turkey: implications for magma interaction in the genesis of high-K calc-alkaline granitoids in a postcollision extensional setting. *Lithos* 98(1): 57-69.
- Kumar, S. (1995) Microstructural evidence of magma quenching inferred from enclaves hosted in the Hodrus a granodiorites, western Carpathians. *Geological Institute, Slovak Academy of Sciences* 46(3):379-382.
- Kumar, S. Rino, V. and Pal, A. B (2004) Field evidence of magma mixing from microgranular enclaves hosted in Palaeoproterozoic. *Contribution to Mineralogy and Petrology* 149(3):324-341.
- Kumar, S. and Rino, V. (2006) Mineralogy and geochemistry of microgranular enclaves in Palaeoproterozoic Malanjkhanda granitoids, Central India: evidence of magma mixing, mingling and chemical equilibration. *Contribution to Mineralogy and Petrology* 152(4):591-609.

- Lacroix, A. (1893) Les enclaves des roches volcaniques. Protat Publication, Mâcon.
- Liankun, S. and Kuirong, Y. (1991) A two-stage crustmantle interaction model for mafic microgranular enclaves in the Doning granodiorite pluton, Guangxi, China. In: Enclaves and granite petrology (Eds. Didier, J. and Barbarin, B.) 148(1): 95-112. Elsevier, Amsterdam.
- Moinevaziri, H. (1985) Volcanisme tertiaire et Quaternaire en Iran. thèse de doctorat, université paris sud orsay, France.
- Noyes, H. J., Wones, D. R. and Frey, F. A. (1983) A tale of two plutons: petrographic and mineralogic constraints on the petrogenesis of the Red Lake and Eagle Peak plutons, Central Sierra Nevada, California. *Journal of Geology* 91(3): 353-379.
- Pabst, A. (1928) Observation on inclusion on the granitic rocks of the Sierra Nevada. *Department of Geological Sciences* 17: 325-386.
- Paterson, S. R., Vernon, R. H. and Tobisch, O. T. (1989) A review of criteria for the identification of magmatic and tectonic foliations in granitoids. *Journal of Structural Geology* 11(3): 349-363.
- Perugini, D., Poli, G., Christofides, G. and Eleftheriadis, G. (2003) Magma mixing in the Sithonia plutonic complex, Greece: evidence from mafic microgranular enclaves. *Mineralogy and Petrology* 78(2): 173-200.
- Rasouli, J. (2015) Petrology, geochemistry and reviewing the zoning alteration and copper mineralization in Jabal Barez granitoid complex (north east Jeroft). PhD thesis, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, (in Persian).
- Rasouli, J., Gourbani, M. and Ahadnejad, V. (2014) Field observations, petrography and microstructures study of Jebale Barez plutonic complex (east-north east Jiroft). *Journal of Tethys* 2(3): 178-195.
- Sabzehei, M. (1994) Geological Quadrangle Map of Iran, Hajiabad, 1:250000, No, 12, Geological Survey of Iran, Tehran.
- Salonsaari, P. T. (1995) Hybridization in the subvolcanic Jaala-Iitti complex and its petrogenetic relation to rapakivi granites and associated mafic rocks of southeastern Finland. *Geological Society of Finland Bulletin* 67(1): 88-104.
- Sergi, A. (1997) Mafic microgranular enclaves from the Xanthi pluton (northern Greece): an example of mafic felsic magma interaction. *Mineralogy and Petrology* 61(1): 97-117.
- Sparks, R. S. J. and Marshal, L. (1986) Thermal and mechanical constraints on mixing between mafic and silicic magmas. *Journal of Volcanology and Geochemical Research* 29(1): 99-124.
- Silva, M. M., Neiva, A. M. R. and Whitehouse, M. J. (2000) Geochemistry of enclaves and host granites from the Nelas area, Central Portugal. *Lithos* 50(1): 153-170.
- Shand, S. J. (1943) Eruptive Rocks. John Wiley & Sons, Inc., New York.
- Stephens, W. E., Holden, P. and Henny P. J. (1991) Microdioritic enclaves within the Scottish Caledonian granitoids and their significance for crustal magmatism. In: Enclaves and granite petrology (Eds. Didier, J. and Barbarin, B.) 125-134. Elsevier, Amsterdam,
- Takin, M. (1972) Iranian geology and continental drift in the middle east. *Nature* 235(1): 147-150.
- Tindle, A. G. (1991) Trace element behavior in microgranular enclaves from granitic rocks. In: Enclaves and Granite Petrology (Eds. Didier, J. and Barbarin, B.) 313-331. Elsevier, Amsterdam.
- Vernon, R. H. (1983) Restite, xenoliths and microgranitoid enclaves in granites (clarke memorial lecture). *Journal and Proceedings of the Royal Society of New South Wales* 116(1): 77-103.
- Vernon, R. H. (1991) Interpretation of microstructures of microgranitoid enclaves. In: Enclaves and

granite petrology (Eds. Didier, J. and Barbarin, B.) 277-291. Elsevier, Amsterdam.

Vernon, R. H. (2000) Review of microstructural evidence of magmatic and solid-state flow. *Electronic Geosciences* 5(1): 112-124.

Vernon, R. H. (2004) *A practical guide to rock microstructure*. Cambridge University Press, Cambridge.

Yilmaz, S. S. (2005) Geochemistry of mafic microgranular enclaves in the Tamdere quartz monzonite, south of Dereli/Giresun, eastern Pontides, Turkey. *Geochemistry* 132(1): 145-162.

Field evidence, microscopic and geochemical data to determine the origin of magmatic enclaves in the Jebale Barez plutonic complex (east and northeast Jiroft)

Jamal Rasouli ^{1*}, Mansour Ghorbani ¹ and Vahid Ahadnejad ²

¹ Department of Geology, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

² Department of Geology, Payame Noor University, 19395-3697 Tehran, I. R. of Iran

Abstract

The Jebale-Barez plutonic complex is composed of granitoid intrusive bodies and is located in the east and northeast of Jiroft and south of the Kerman province. The plutonic complex is composed of granodiorite, quartz diorite, syenogranite and mostly granite. This plutonic complex includes abundant rounded and ellipsoid magmatic enclaves ranging in size from a few millimeters to 30 centimeters and varying in composition from quartz diorite, monzodiorite to quartz monzodiorite. These enclaves are very fine-grained and show chilled margin and their crystal size gradually decreases from center to the margin. The chilled margin is an evidence of rapid magma cooling once the enclaves were surrounded by host felsic magma. The mingling of two magmas is testified by presence of the disequilibrium textures such as: poikilitic and antipertite textures in the K-feldspar megacrysts, rounded, corroded and altered plagioclases, mafic clots, acicular apatites, small lath-shaped plagioclases in the large plagioclases as well as the occurrence of mafic microgranular enclaves with crenated and cusped contact with the felsic -host rocks. Also, the plagioclase crystals display essentially normal and occasionally oscillatory zoning. The enclaves and their host rocks, geochemically is different. The former is Na-enriched whilst the latter is enriched in K. Furthermore, the enclaves are depleted in LREE and LILE while are enriched in HREE and Ti in analogy to their host granodiorites. Therefore, it seems that the enclaves and granodiorites have been originated from two different magmas which were placed adjacent to each other by magma mingling and mixing process.

Key words: Magma mingling, Magmatic enclaves, Active continental margin, Jebale Barez, Uromieh-Dokhtar magmatic zone

* m-ghorbani@sbu.ac.ir