

زمین‌شیمی عناصر نادر خاکی و بازسازی فرمول ساختاری گارنت‌های بابانظر، شمال شرق تکاب، استان آذربایجان غربی

صمد علیپور*، پریوا شیرمحمدی و یوسف رحیم‌سوری
گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

اندیس گارنت بابانظر کانی‌سازی شده در یک توده هورنفلس در ۸۰ کیلومتری شمال شرقی تکاب در استان آذربایجان غربی واقع شده است. حضور هورنفلس و آثار کربنات نشان می‌دهد که اسکارن گارنت‌دار در محل برخورد توده گرانیته معادل دوران با توده‌های آرژیلیتی و آهکی طی دگرگونی مجاورتی تشکیل شده است. بلورهای گارنت به درشتی تا ۲ سانتی‌متر به صورت نیمه شکل‌دار و در نور متقارب با بی‌شکل، ایزوتروپ با برجستگی بالا و شکستگی فراوان دیده می‌شود. تجزیه عناصر اصلی نشان می‌دهد که ترکیب بیشتر گارنت بابانظر در سری محلول جامد آندرادیت-گروسلاریت قرار دارد و در سه نمونه درصد پیروپ از گروسلار با اختلاف اندکی بیشتر است. تجزیه پرتو ایکس انجام شده، حضور کانی‌های آندرادیت و گروسلار را تأیید می‌نماید. همه انواع بلورهای گارنت با رنگ‌های مختلف، تهی‌شدگی باریم، هافنیم، توریم، اسکاندیوم، کبالت، تانتالیوم و نیوبیوم و غنی‌شدگی زیرکونیوم، ایتریم، اورانیوم، وانادیوم و تیتانیوم را نشان می‌دهند. الگوی توزیع عناصر نادر خاکی بهنجار شده نسبت به کندریت برای تمام انواع گارنت‌ها با رنگ‌های مختلف به دلیل درصد فراوان آندرادیت نسبت به اعضای نهایی دیگر گارنت، دلالت بر غنی‌شدگی شدید عناصر نادر خاکی سبک نسبت به سنگین دارد و به دلیل شرایط اکسیدان سیال گرمایی در این ذخیره بی‌هنجاری مثبت سریم نشان می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: زمین‌شیمی، عناصر نادر خاکی، گارنت، بابانظر، تکاب، پهنه سندنجد-سیرجان

مقدمه

جامد پیرالسپیت شامل: پیروپ ($\text{Mg}_3\text{Al}_2\text{Si}_3\text{O}_{12}$).

آلمانیدین ($\text{Fe}_3\text{Al}_2\text{Si}_3\text{O}_{12}$) و اسپسارترین
($\text{Mn}_3\text{Al}_2\text{Si}_3\text{O}_{12}$) و اوگراندیت شامل: آندرادیت
($\text{Ca}_3\text{Fe}_2\text{Si}_3\text{O}_{12}$)، گروسلار ($\text{Ca}_3\text{Al}_2\text{Si}_3\text{O}_{12}$) و
اواروویت ($\text{Ca}_3\text{Cr}_2\text{Si}_3\text{O}_{12}$) در انواعی از رنگ‌های
مختلف رشد می‌کند (Klein and Harlbut,

گارنت به عنوان یکی از کانی‌های دارای
پتانسیل اقتصادی در سنگ‌های دگرگونی با فرمول
شیمیایی عمومی $\text{X}_3\text{Y}_2\text{Z}_3\text{O}_{12}$ است (Menzer,
1926) که به دلیل امکان جایگزینی کاتیون‌های
عناصر اصلی و کمیاب، به صورت سری‌های محلول

* s.alipour@urmia.ac.ir

گرانیتی در نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ چهارگوش تکاب (Alavi et al., 1982) تحت عنوان گرانیت دوران با سن پركامبرين گزارش شده است. اما در نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ چهارگوش تخت سلیمان (Babakhani and Ghalamghash, 1992) با توجه به این که رسوبات ماسه‌سنگی سازند لالون با سن کامبرين را قطع کرده و توسط رسوبات آهکی سازند قم با سن الیگوسن-میوسن پوشیده شده، در بازه سنی بعد از کامبرين و قبل از الیگوسن در نظر گرفته شده است. واحدهای سنگی رخنمون یافته در منطقه شامل: شيست، هورنفلس به صورت متناوب با توده گرانیتی و گدازه‌های آندزیت پورفیری (الیگو-میوسن) است (شکل ۱). علاوه بر واحدهای سنگی یاد شده، پیرامون محدوده گارنت‌دار تعدادی رگه و رگچه‌هایی از اکسید آهن با ضخامت‌های متغیر تا پنج متر، حداکثر طول ۱۰ متر و ترکیب هماتیتی-لیمونیتی کوارتزدار رخنمون دارد (شکل ۲).

روش انجام پژوهش

در پی مطالعات صحرایی، تعداد ۲۶ مقطع نازک و صیقلی برای مطالعات پتروگرافی تهیه و بررسی شد. همچنین، پس از جداسازی بلورهای گارنت درشت با رنگ‌های مختلف از سنگ میزبان (شکل ۳-E) و آسیاب کردن بلورها تا ۲۰۰ مش، تعداد ۱۰ نمونه از بلورهای پودر شده با روش تجزیه فلورسانس پرتو ایکس (XRF) برای تعیین عناصر اصلی و تعداد ۹ نمونه با روش طیف‌سنجی گسیل پلاسمای جفت شده القایی (ICP-OES) برای تعیین عناصر جزئی در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی تهران اندازه‌گیری شیمیایی شدند. علاوه بر این، تعداد دو نمونه از گارنت‌های تقریباً خالص درشت‌بلور در حد یک سانتی‌متر

(1999). تنوع رنگ در آنها یکی از شاخص‌های ارزش اقتصادی این کانی است. در بخش‌هایی از شهرستان تکاب واقع در پهنه سنندج-سیرجان، پتانسیل‌هایی از گارنت مانند: گارنت عرب‌شاه، قینرجه و بابانظر وجود دارد. گارنت‌های تشکیل شده در حوالی روستای بابانظر یکی از این اندیس‌ها است که به طور غالب با رنگ سبز زمردی و در مقدار کمتر قهوه‌ای و سیاه با پتانسیل اقتصادی مشاهده می‌شود. ترکیب این گارنت‌ها تا انجام این تحقیق مشخص نبوده و تاکنون مطالعاتی بر روی نوع کانی و عناصر نادر و نادر خاکی آن انجام نشده است. این پژوهش با هدف مطالعه زمین‌شیمی عناصر اصلی تشکیل‌دهنده گارنت‌ها، عناصر نادر و نادر خاکی و بازسازی فرمول ساختاری کانی‌های گارنت بابانظر انجام شد.


زمین‌شناسی منطقه

اندیس گارنت بابانظر در ۸۰ کیلومتری شمال‌شرقی تکاب (استان آذربایجان غربی)، چهارگوش زمین‌شناسی تخت‌سلیمان با مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ و چهارگوش زمین‌شناسی تکاب با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ بین طول‌های جغرافیایی ۴۷°۱۶' تا ۴۷°۱۷' و عرض‌های جغرافیایی ۳۶°۳۷' تا ۳۶°۳۸' قرار گرفته است (Alavi et al., 1982; Babakhani and Ghalamghash, 1992). از دیدگاه تقسیم‌بندی پهنه‌های ساختمانی ایران در محدوده پهنه سنندج-سیرجان و محل برخورد پهنه‌های ساختمانی البرز-آذربایجان و ایران مرکزی قرار دارد (Babakhani and Ghalamghash, 1992).



این اندیس در هاله دگرگونی مجاورتی مرتبط با توده گرانیتی سفید رنگ با بافت میکروگرانیت، کوارتزپورفیری و آپلیتی تشکیل شده است. توده

اصلی با نرم‌افزار AX WIN و با توجه به حضور تعداد ۸ کاتیون و ۱۲ اتم اکسیژن در ساختار گارنت (Klein and Harlbut, 1999) فرمول ساختاری این کانی بر اساس ۸ کاتیون و ۱۲ اکسیژن تعیین شده است.

برای تعیین فازهای کانیایی با روش XRD آزمایش شدند. در این مطالعه با توجه به تنوع رنگ بلورهای گارنت، فرمول ساختاری انواع گارنت‌ها با رنگ‌های مختلف بازسازی و با هم مقایسه شد. پس از محاسبه کاتیون‌های اکسیدهای عناصر



شکل ۱- نقشه زمین‌شناسی منطقه بابانظر، همراه با نقشه راه‌های دسترسی به منطقه و موقعیت آن در پهنه‌های زمین‌ساختی ایران (Gilg et al., 2006).



شکل ۲- A) ذخیره گارنت همراه با رخنمون تناوب هورنفلز- توده گرانیته و واحد آندزیت پورفیری؛ B) رخنمون واحد هورنفلز و توده گرانیته همراه با موقعیت روستای بابانظر؛ C) قطع شدگی رگه هماتیته توسط گسل در منطقه بابانظر.

شیمی کانی

در نمونه‌های ماکروسکوپی مربوط به هورنفلز، بلورهای گارنت به رنگ‌های سبز تیره، قهوه‌ای متمایل به سبز، قهوه‌ای متمایل به قرمز و سیاه دیده می‌شوند.

اندازه بلورهای گارنت از یک میلی‌متر تا بیشتر از دو سانتی‌متر تغییر می‌کند. در بین انواع بلورهای گارنت با رنگ‌های مختلف، بلورهای سبز تیره رشد زیادی کرده‌اند و اندازه بزرگ‌تری دارند و فراوانی بلورهای سبز تیره و قهوه‌ای متمایل به سبز بیشتر است (شکل ۳). بلورهای گارنت در زیر میکروسکوپ به صورت بلورهای نیمه شکل‌دار و به طور عمده بی‌شکل ایزوتروپ با برجستگی بالا و شکستگی فراوان دیده می‌شوند که بیشتر از حواشی به کلریت دگرسان شده‌اند. شکستگی‌های

گارنت تا حدودی با کانی‌های کوارتز و کلسیت ثانویه حاصل از نفوذ سیال گرمابی غنی از این ترکیبات پر شده است. کانی‌های همراه گارنت در سنگ میزبان شامل: کانی‌های غیر فلزی اپیدوت، اکتیونولیت-ترمولیت، کلینوپیروکسن، اسفن، کوارتز، کلسیت و پلاژیوکلاز و کانی‌های فلزی کالکوپیریت، لیمونیت، هماتیت و گوتیت است (شکل‌های ۴، ۵ و ۶).

زمین‌شیمی گارنت بابانظر: محاسبه کسر مولی نمونه‌های تجزیه شده با فرض ۸ کاتیون و ۱۲ اکسیژن ساختار گارنت‌ها بر اساس رابطه‌های ۱ تا ۶ انجام و نتایج آن در جدول ۱ درج شده است. این روابط با توجه به توانایی جانشینی عناصر با شعاع و بار یونی یکسان در جایگاه‌های Y و X فرمول ساختاری $X_3Y_2Z_3O_{12}$ تعریف شده است.

رابطه (۱)

$$X_{\text{Adr}} = \text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{3+} + \text{Al} + \text{Cr}$$

رابطه (۲)

$$X_{\text{Pyp}} = \text{Mg} / \text{Mg} + \text{Mn} + \text{Ca} + \text{Fe}^{2+}$$

رابطه (۳)

$$X_{\text{Alm}} = \text{Fe}^{2+} / \text{Mg} + \text{Mn} + \text{Ca} + \text{Fe}^{2+}$$

رابطه (۴)

$$X_{\text{Sps}} = \text{Mn} / \text{Mg} + \text{Mn} + \text{Ca} + \text{Fe}^{2+}$$

رابطه (۵)


$$X_{\text{Uva}} = \text{Cr} / \text{Fe}^{3+} + \text{Al} + \text{Cr}$$

رابطه (۶)


$$X_{\text{Grs}} = \text{Ca} / \text{Mg} + \text{Mn} + \text{Ca} + \text{Fe}^{2+}$$




شکل ۳- A) بلورهای سبز تیره؛ B) بلورهای قهوه‌ای متمایل به سبز؛ C) بلورهای سیاه؛ D) بلورهای قهوه‌ای متمایل به قرمز؛ E) بلورهای سبز تیره جدا شده از سنگ میزبان منطقه بابانظر.



شکل ۴- A و B) تصاویر میکروسکوپی گارنت ایزوتروپ که از حواشی به کلریت دگرسان می‌شود همراه با کوارتز پرکننده شکستگی‌های گارنت در منطقه بابانظر (XPL و PPL)؛ C) بلورهای ایزوتروپ گارنت همراه با کلسیت؛ D) بلور اکتینولیت-ترمولیت همراه با گارنت (XPL). علائم اختصاری به کار رفته عبارتند از: Grt = گارنت، Cal = کلسیت، Qtz = کوارتز، Chl = کلریت و Act = اکتینولیت-ترمولیت



شکل ۵- تصاویر میکروسکوپی از کانی‌های منطقه بابانظر. A) بلور خودشکل پلاژیوکلاز به همراه اسفن و کلریت ثانویه (XPL)؛ B) کانی‌های لیمونیت، گوتیت، کالکوپیریت و هماتیت همراه با گارنت. علائم اختصاری به کار رفته عبارتند از: Chl = کلریت، Plg = پلاژیوکلاز، Sph = اسفن، Grt = گارنت، Goe = گوتیت، Hem = هماتیت، Cpy = کالکوپیریت و Lim = لیمونیت.



شکل ۶- تصاویر میکروسکوپی از کانی‌های منطقه بابانظر. (A) بلورهای نیمه شکل‌دار اپیدوت همراه با کلسیت (XPL)؛ (B) بلور شکل‌دار کلینوپیروکسن همراه با گارنت (XPL). علایم اختصاری به کار رفته عبارتند از: Cal = کلسیت، Epi = اپیدوت، Grt = گارنت و Cpx = کلینوپیروکسن

جدول ۱- محاسبه فرمول ساختاری گارنت‌های بابانظر. GB (بلورهای قهوه‌ای متمایل به سبز)؛ DG (بلورهای سبز تیره)؛ B (بلورهای سیاه) و RB (بلورهای قهوه‌ای متمایل به قرمز)

Sample	B-7-3-GB	B-8-4-B	B-8-4-RB	B-8-4-DG	B-8-4-GB	B-9-5-DG	B-10-6-GB	B-11-7-GB	B-6-2-DG	B-6-2-GB
SiO ₂	33.70	34.17	33.93	38.23	36.81	35.91	35.36	38.31	39	42.64
TiO ₂	0.95	1.05	0.51	0.96	0.93	0.80	0.56	0.59	0.55	0.70
Al ₂ O ₃	5.87	7.54	11.60	6.85	7.18	6.56	5.65	5.86	5.65	4.54
Cr ₂ O ₃	0.05	0.00	0.05	1.21	0.19	1.70	0.05	0.05	1.86	0.00
Fe ₂ O ₃	22.07	23.46	16.79	17.60	20.36	17.39	21.54	20.38	15.19	11.49
FeO	0.20	0.21	0.15	1.88	1.15	0.16	0.20	0.19	3.07	3.82
MnO	0.20	0.23	0.33	0.25	0.22	0.05	0.30	0.21	0.05	0.25
MgO	3.43	0.52	0.80	2.90	2.80	3.04	3.20	4.43	4.77	0.18
CaO	31.11	31.78	31.85	30.63	30.01	32.59	31.43	30.38	27.53	28.48
Na ₂ O	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00
K ₂ O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	97.56	99.13	96.02	100.51	99.65	98.7	98.37	100.40	97.73	98.10
Si ⁴⁺	2.829	2.826	2.830	3.054	2.977	2.952	2.929	3.056	3.174	3.401
Ti ²⁺	0.060	0.065	0.032	0.058	0.057	0.050	0.036	0.036	0.034	0.042
Al ³⁺	0.581	0.735	1.141	0.645	0.685	0.638	0.551	0.551	0.542	0.427
Cr ³⁺	0.003	0.00	0.003	0.076	0.012	0.110	0.003	0.003	0.119	0.00
Fe ³⁺	1.394	1.460	1.053	1.055	1.237	1.076	1.343	1.223	0.930	0.687
Fe ²⁺	0.014	0.015	0.011	0.128	0.080	0.011	0.014	0.012	0.209	0.257
Mn ²⁺	0.014	0.016	0.023	0.017	0.015	0.003	0.021	0.014	0.003	0.017
Mg ²⁺	0.429	0.064	0.099	0.345	0.337	0.372	0.395	0.527	0.579	0.735
Ca ²⁺	2.799	2.817	2.846	2.621	2.600	2.871	2.789	2.597	2.400	2.434
Na ⁺	0.00	0.027	0.00	0.00	0.00	0.008	0.008	0.00	0.008	0.00
K ⁺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	8.123	8.025	8.040	8	8	8.091	8.090	8.020	8.00	8

Sample	B-7-3-GB	B-8-4-B	B-8-4-RB	B-8-4-DG	B-8-4-GB	B-9-5-DG	B-10-6-GB	B-11-7-GB	B-6-2-DG	B-6-2-GB
ادامه جدول ۱-.....										
Fe ²⁺ +Ca+Mn+Mg	3.256	2.912	2.979	3.11	3.032	3.257	3.219	3.15	3.191	3.443
Cr+Al+Fe ³⁺	1.978	2.195	2.197	1.776	1.934	1.824	1.897	1.777	1.591	1.114
Andradite (%)	70.47	66.51	47.92	59.40	63.93	58.99	70.79	68.82	58.45	61.66
Grossular (%)	15.37	30.25	47.5	20.6	21.19	23.13	15.71	13.47	9.31	9.05
Pyrope (%)	13.17	2.19	3.32	11.08	11.11	11.42	12.27	16.73	18.14	21.34
Spssartine (%)	0.42	0.54	0.77	0.54	0.49	0.09	0.65	0.44	0.09	0.49
Almandine (%)	0.42	0.51	0.36	4.11	2.63	0.33	0.43	0.38	6.54	7.46
Uvarovite (%)	0.15	0.00	0.13	4.27	0.62	6.03	0.15	0.16	7.47	0.00



نتایج نشان می‌دهد که ترکیب شیمیایی گارنت در تمام نمونه‌های برداشت شده از این اندیس تقریباً مشابه است و ترکیب آنها در سری آندرادیت-گروسالاریت قرار می‌گیرد. در سه نمونه (B-11-7-GB، B-6-2-DG و B-6-2-GB) گارنت نوع پیروپ منیزیم با شعاع یونی کوچک‌تر به جای کلسیم با شعاع یونی به نسبت بزرگ‌تر است. همچنین، یک تغییری در ترکیب بین انواع گارنت‌ها با رنگ‌های مختلف دیده می‌شود. به عنوان مثال: بلورهای سبز تیره و قهوه‌ای متمایل به سبز نسبت به دو نوع دیگر ترکیب مشابه‌تری داشته و مقادیر کانی‌های سری پیرالسپیت در آنها بیشتر است. در حالی که کانی‌های سری پیرالسپیت در ترکیب بلورهای قهوه‌ای متمایل به قرمز و سیاه کمتر است و همچنین، مقدار گروسالار در ترکیب بلورهای قهوه‌ای متمایل به قرمز نسبت به سه نوع دیگر بیشتر است (شکل ۷). اوارویت جزو یکی از کمیاب‌ترین کانی‌های خانواده گارنت بوده و در ترکیب بلورهای سبز تیره درصد این جزو نسبت به سه نوع بلور دیگر بیشتر است و میانگین آن به شش درصد می‌رسد (جدول ۱). رنگ سبز تیره در بلورهای گارنت به دلیل حضور کروم (عضو نهایی اوارویت) به عنوان رنگیزه در ترکیب شیمیایی گارنت است.

کانی‌شناسی پرتو ایکس: برای تشخیص نوع کانی‌های تشکیل‌دهنده، تعداد دو نمونه از بلورهای تقریباً خالص گارنت مورد آزمایش پرتو ایکس قرار داده شد (شکل ۸). انواع بلورهای تشخیص داده شده در این آزمایش در هماهنگی کامل با ترکیب حاصل از بازسازی فرمول ساختاری گارنت‌ها است. گارنت‌های فاز اصلی شامل: آندرادیت، گروسالار و هیدروگروسالار و کانی‌های فاز فرعی شامل: اوژیت، کلریت و کوارتز است. حضور این فازهای فرعی در تجزیه XRD به دلیل هم‌رشدی گارنت با کلینوپیروکسن، دگرسانی جزئی گارنت به کلریت و حضور کوارتز در رگه‌ها و رگچه‌ها است.


زمین‌شیمی عناصر نادر خاکی: الگوی حاصل از تجزیه عناصر جزئی (جدول ۲) تشکیل‌دهنده گارنت‌های بابانظر بهنجار شده نسبت به کندریت (شکل ۹) در تمام نمونه‌های بلورهای گارنت نشان می‌دهد که الگوی توزیع این عناصر دلالت بر غنی‌شدگی شدید عناصر نادر خاکی سبک نسبت به عناصر نادر خاکی سنگین و بی‌هنجاری ضعیف مثبت Eu و Ce دارد. همچنین، این الگوی توزیع برای انواع رنگ‌های مختلف گارنت یکسان است و تغییر رنگ تأثیری در این الگو نداشته است (شکل ۹). براساس مطالعات انجام شده، جانشینی REEs در ساختار گارنت با ساختار و شیمی بلوری گارنت کنترل

می‌شود (Menzer, 1926). این کنترل به وسیله واکنش جانشینی REEs در گارنت اوگراندیت (آندرادیت-گروسالاریت) توسط رابطه ۷ توجیه می‌شود (Gaspar *et al.*, 2008).

رابطه ۷)




شکل ۷- نمودار سه‌تایی ترکیب بلورهای گارنت بابانظر. Grs=گروسالار، Adr=آندرادیت، Pyrralspite=پیروپ، آلماندن، اسپسارتین و اورویت، GB=بلورهای قهوه‌ای متمایل به سبز، DG=بلورهای سبز تیره، B=بلورهای سیاه و RB=بلورهای قهوه‌ای متمایل به قرمز (Gaspar *et al.*, 2008)



شکل ۸- نتایج حاصل از تجزیه XRD کانی‌های منطقه بابانظر

جدول ۲- نتایج تجزیه ICP-OES گارنت‌های بابانظر. REEs (مجموع عناصر نادر خاکی)، LREEs (مجموع عناصر نادر خاکی سبک) و HREEs (مجموع عناصر نادر خاکی سنگین).

Sample	B-6-2-Gb	B-11-7-Cb	B-8-4-DG	B-8-4-Gb	B-6-2-Dg	B-8-4-B	B-10-6-Gb	B-9-5-Dg	B-7-3-Gb
La(ppm)	13.1	12.6	12.8	15.2	15.5	15.9	12.1	12.6	13.3
Ce	48.0	59.6	54.6	77.1	63.1	44.2	54.1	55.6	59.7
Pr	3.1	6.2	3.2	8.1	5.3	4.6	3.6	4.3	5.2
Nd	37.2	48.8	45.4	71.7	44.9	48.8	44.2	50.4	50.5
Sm	9.3	11.2	10.6	13.2	8.6	12.9	11.6	10.6	11.3
Eu	1.8	3.5	4.3	6.1	4.1	5.9	2.7	5.1	3.5
Gd	1.7	5.5	1.9	7.2	5.1	3.5	2.0	3.8	4.1
Tb	0.8	1.0	1.1	1.4	0.8	1.4	0.9	1.1	1.0
Dy	8.6	8.9	8.2	14.1	3.3	9.6	8.5	8.1	10.0
Ho	0.5	0.6	0.5	1.0	0.4	0.6	0.9	0.6	0.8
Er	1.6	2.8	1.1	4.4	1.1	1.6	0.9	1.8	2.4
Tm	0.1	0.3	0.1	0.5	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3
Yb	6.3	6.1	5.4	10.3	2.4	5.8	5.6	5.2	7.1
Lu	0.1	0.3	0.1	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2	0.3
ΣREEs	132.1	167.6	149.5	230.7	155.3	155.2	147.3	159.6	169.4
ΣLREEs	114.2	147.4	132.9	198.6	146.6	135.7	130.2	142.4	147.6
ΣHREEs	18.0	20.2	16.5	32.1	8.7	19.4	17.0	17.2	21.8
Th	31.6	37.5	35.4	44.5	65.8	39.6	38.9	38.9	38.1
Hf	9.4	12.0	7.6	8.6	17.4	12.2	4.2	10.1	8.6
Cr	93.1	411.1	6303.8	1299.3	>10000	56.2	72	>10000	468.8
Zr	200.7	176.3	116.2	381.7	42.1	193.2	209.9	108.6	242.1
Y	51.0	47.7	45.5	85.7	9.0	48.6	44.3	43.8	57.1
U	1.4	6.2	1.8	7.6	5.5	3.9	2.5	3.6	4.4
V	135.7	132.9	101.1	110.1	126.2	112.1	115.7	112.8	123.6
Co	8.9	14.6	10.4	11.7	16.4	10.4	10.2	13.3	11.3
Sc	13.4	12.1	14.9	20.6	7.8	10.8	6.8	13.7	13.2
Nb	6.9	14.3	5.2	46.0	30.6	18.9	7.9	29.3	18.8
Ta	2.6	4.2	7.0	4.6	12.5	1.8	3.0	10.1	3.6
Ti	3670.6	3996.4	4607.7	6031.0	3726.6	6002.2	3377.0	4803.2	4268.8
Sr	55.7	85.2	62.0	99.5	134.9	91.1	74.1	77.8	78.6
Rb	74.1	79.3	72.6	70.2	73.7	64.0	71.1	78.3	73.7
Cs	5.0	4.3	6.2	7.3	2.7	7.4	4.8	6.5	5.4



شکل ۹- الگوی توزیع عناصر نادر خاکی بهنجار شده نسبت به کندریت (Taylor and McLennan, 1985)

وسیله آهن آندرادیت تثبیت شده است. همچنین، در الگوی توزیع عناصر نادر خاکی نرمالیزه شده به کندریت گادولینیوم (Gd) به دلیل اثر تتراد (tetrad effect) بی‌هنجاری منفی چشمگیری نشان می‌دهد (شکل ۹).

زمین‌شیمی عناصر لیتوفیل و سیدروفیل: با توجه به این که بعضی از عناصر لیتوفیل و سیدروفیل به مقدار جزئی در ترکیب شیمیایی گارنت جانشین عناصر اصلی می‌شوند، تغییرات این عناصر نسبت به عضو نهایی آندرادیت بررسی شده است. در بین عناصر لیتوفیل درشت یون (LILEs)، باریوم (Ba) تغییرات چشم‌گیری را به صورت همبستگی منفی نسبت به آندرادیت نشان می‌دهد (شکل ۱۰). این همبستگی منفی با آندرادیت می‌تواند از اندازه بزرگ‌تر شعاع یونی باریوم نسبت به جایگاه X با هم‌آرایی هشت در ساختار گارنت ناشی شود (Gaspar et al., 2008).

در بین عناصر لیتوفیل با قدرت میدان بالا (HFSEs) زیرکونیوم (Zr) و ایتریوم (Y) دارای همبستگی مثبت قوی با آندرادیت است که نشانه حضور زیرکن به صورت اینکلوزن در بلورهای گارنت است و Y در ترکیب کانی زیرکن جانشین Zr شده و همراه با این عنصر نسبت به آندرادیت همبستگی مثبت نشان می‌دهد. همبستگی منفی هافنیوم (Hf) و توریوم (Th) با آندرادیت همراه همبستگی مثبت جزئی اورانیوم (U) (شکل ۱۰) نشانه کمبود اورانیوم اولیه در گرانیته بوده و مقادیر اندکی هافنیوم و توریوم حاصل از واپاشی اورانیوم در این کانی‌ها تولید شده است.

در ترکیب گارنت‌های بابانظر اورانیوم و وانادیوم بر خلاف اسکاندیوم و کبالت نسبت به عضو نهایی

بر اساس مطالعات انجام شده بر روی داده‌های ترمودینامیکی اسکارن طلای Crown Jewel واشنگتن، نتیجه‌گیری شده است که در سری محلول جامد اوگراندیت، HREEs در ترکیبات گروسلار و LREEs در ترکیبات آندرادیت جانشین شده‌اند (Gaspar et al., 2008). در مقایسه بین انواع گارنت‌های بابانظر نیز فراوانی عمده مربوط به آندرادیت بوده و عناصر نادر خاکی سبک نسبت به عناصر نادر خاکی سنگین در آن غنی‌شدگی تقریباً ۸ برابر را نشان می‌دهد (شکل ۷).

در بین عناصر نادر خاکی، Eu و Ce بر خلاف سایر عناصر، دارای ظرفیت‌های متغیری هستند که بسته به شرایط محیطی تغییر می‌کند. به همین دلیل برای تفسیر شرایط pH و Eh محیط به کار می‌روند. بی‌هنجاری مثبت ضعیف Eu در گارنت‌های نرمالیزه شده به کندریت نشان می‌دهد که Eu در نمونه‌های تجزیه شده به صورت Eu^{2+} حضور دارد و در ترکیب گارنت‌های آندرادیت-گروسلار جانشین Ca شده است (Gaspar et al., 2008). Eu^{2+} موجود در این کانی از فلدسپارهای توده گرانیته تأمین شده است. آنومالی مثبت Ce در گارنت‌های مطالعه شده نشان‌دهنده شرایط اکسیدان سیال گرمابی در منطقه است (Zhiwei and Zhenhua, 2003).

در بین عناصر نادر خاکی سنگین (HREE) ایتربیوم (Yb) بی‌هنجاری مثبت شدیدی نشان می‌دهد (شکل ۹). ایتربیوم در سامانه‌هایی که آب سیال غالبی است غیر متحرک است اما با ورود کربنات به دلیل تشکیل کمپلکس با این عناصر متحرک می‌شود (Jenner, 1996). این عنصر پس از انتقال توسط کربنات‌ها، در ترکیب گارنت به

آندرادیت غنی‌شدگی ضعیف نشان می‌دهند (شکل ۱۰). اورانیوم و وانادیوم در ترکیب گارنت جایگزین آهن فریک می‌شوند (Deer et al., 1992؛ Zahedi et al., 2013). اما اسکاندیوم و کبالت جایگزین آهن فرو می‌گردند (Zahedi et al., 2013). کمبود اسکاندیوم و کبالت و فراوانی اورانیوم و وانادیوم در گارنت باینظر به دلیل حضور آهن فریک در ترکیب آن است.


نتتالیوم (Ta) و نیوبیوم (Nb) شعاع (۰/۶۸۰ آنگستروم) و بار یونی مشابهی دارند و جزو عناصر متحرک محسوب می‌شوند (Shannon, 1976؛ Shannon and Prewitt, 1969). این عناصر به دلیل شعاع و بار یونی مشابه رفتار ژئوشیمیایی مشابهی با تغییر میزان عضو نهایی آندرادیت در گارنت‌های باینظر نشان می‌دهند و هر دو نسبت به آندرادیت همبستگی منفی دارند (شکل ۱۰).

در ترکیب گارنت تیتانیوم جایگزین آهن سه ظرفیتی می‌شود (Deer et al., 1992). در بین عناصر لیتوفیل مقدار تیتانیوم در تمام نمونه‌ها بیشتر است و میانگین آن به ۴۴۹۸/۱۶ ppm می‌رسد که شاید این غنی‌شدگی به جایگزینی تیتانیوم در عناصر با ظرفیت بالا در ترکیب گارنت‌های آندرادیت مربوط می‌شود.

نتیجه‌گیری

نتایج حاصل از بازسازی فرمول ساختاری و تجزیه XRD نشان می‌دهد که ترکیب گارنت‌های باینظر در سری محلول جامد آندرادیت-گروسالاریت قرار می‌گیرد و فقط در سه نمونه

گارنت نوع پیروپ از گروسالار با اختلاف اندکی بیشتر است. در بین انواع بلورهای گارنت با رنگ‌های مختلف، بلورهای سبز تیره و قهوه‌ای متمایل به سبز ترکیب تقریباً مشابهی دارند و مقادیر کانی‌های سری پیرالسپیت در ترکیب این بلورها بیشتر است. الگوی توزیع عناصر نادر خاکی بهنجار شده نسبت به کندریت دلالت بر غنی‌شدگی عناصر نادر خاکی سبک نسبت به عناصر نادر خاکی سنگین و بی‌هنجاری مثبت ضعیف یوروپیوم و مثبت سریوم دارد. غنی‌شدگی عناصر نادر خاکی سبک مرتبط با ترکیب آندرادیت گارنت باینظر است و بی‌هنجاری مثبت یوروپیوم نشان‌دهنده حضور این عنصر به شکل دو ظرفیتی و بی‌هنجاری مثبت سریوم نشان‌دهنده شرایط اکسیدان سیال گرمایی است. الگوی توزیع عناصر نادر خاکی بهنجار شده نسبت به کندریت برای انواع بلورهای گارنت با رنگ‌های مختلف مشابه است که نشان‌دهنده نقش اصلی ساختمان اتمی گارنت در توزیع عناصر نادر خاکی است. همه بلورهای گارنت با رنگ‌های مختلف تهی‌شدگی باریوم، هافنیوم، توریوم، اسکاندیوم، کبالت، تانتالیوم و نیوبیوم و غنی‌شدگی زیرکونیوم، ایتریوم، اورانیوم، وانادیوم و تیتانیوم را نشان می‌دهند. علت این غنی‌شدگی و تهی‌شدگی بار و شعاع یونی متفاوت این عناصر و توانایی جانشینی آنها در ساختار گارنت آندرادیت-گروسالاریت است. رنگ زیبای سبز زمردی گارنت‌های این اندیس می‌تواند از بعد اقتصادی حایز اهمیت زیادی باشد و مطالعات اکتشافی و ایزوتوپی می‌تواند مهم باشد.



شکل ۱۰- تغییرات عناصر لیتوفیل و سیدروفیل نسبت به ترکیب گارنت آندراپیت در منطقه بابانظر

سپاسگزاری

تکمیلی دانشگاه ارومیه برای اجرای این پژوهش
سپاسگزاری می‌نمایند.

نگارندگان از کمک‌های مالی معاونت تحصیلات

منابع

- Alavi, M., Hajian, J., Amidi, M., Tatavosian, Sh., Aghanabati, A. and Pelisser, G. (1982) Geological Map of Takab 1:250000, No. 3816, Geological Survey of Iran, Tehran.
- Babakhani, A. R. and Ghalamghash, J. (1992) Geological Map of Thakh-E-Soleyman 1:100000, No. 5463, Geological Survey of Iran, Tehran.
- Deer, W. A., Howie, R. A. and Zussman, J. (1992) An introduction to the rock-forming minerals. Longman Scientific and Technical, London.
- Gaspar, M., Knaack, C., Meinert, L. D. and Moretti, R. (2008) REE in skarn system: a LA-ICP-MS study of garnet from the Crown Jewel gold deposit. *Geochimica et Cosmochimica Acta* 72: 185-205.
- Gilg, H. A., Boni, M., Balassone, G., Allen, C. R., Banks, D. and Moore, F. (2006) Marble- hosted sulfide ores in the Angouran Zn-(Pb-Ag) deposit, NW Iran: interaction of sedimentary brines with a metamorphic core complex. *Mineralum Deposita* 4: 1-16.
- Klein, C. and Hurlbut, Jr. C. S. (1999) Manual of mineralogy (after Dana). 21st edition, John Wiley and Sons, New York.
- Jenner, G. A. (1996) Trace element geochemistry of igneous rocks: geochemical nomenclature and analytical geochemistry. In: Trace element geochemistry of volcanic rocks: applications for massive sulphide exploration (Ed. Wyman, D. A.) 51-77. Geological Association of Canada Short Course Notes.
- Menzer, G. (1926) Die kristall structure von granat. *Zeitschrift fu Kristallographie* 63: 157-158.
- Shannon, R. D. (1976) Revised effective ionic radii and systematic studies of interatomic distances in halides and calcogenides. *Acta Crystallographica* A32: 751-767.
- Shannon, R. D. and Prewitt, C. T. (1969) Effective ionic radii in oxides and fluorides. *Acta Crystallographica* B25: 925-946.
- Taylor, S. R. and McLennan, S. M. (1985) The continental crust: its composition and evolution. Blackwell, Oxford.
- Zahedi, A., Boomeri, M. and Mackizadeh, M. A. (2013) REE geochemistry in skarn garnets from Khut and Panah-Kuh ore deposit, west of Yazd. *Petrology* 13: 47-66 (in Persian).
- Zhiwei, B. and Zhenhua, Z. (2003) Rare-earth element mobility during ore- forming hydrothermal alteration: a case study of dongping gold deposit, Hebei province, China. *Chinese Journal of Geochemistry* 1: 45-57.

Geochemistry of REEs and reconstruction of structural formula of Baba-Nazar garnet index, Takab, W.Azarbayedjan, Iran

Samad Alipour *, Pariva Shirmohammadi and Yousef Rahim Souri
Department of Geology, Faculty of Sciences, Urmia University, Urmia, Iran

Abstract

The Baba-Nazar garnet deposit mineralized in hornfelsic body is located 80 km of NE of Takab town, Western- Azarbayedjan province. Ten samples from coarse-grained garnets of various colors were selected for major elements analysis by XRF and nine of these samples were analyzed for trace elements by ICP-OES. The presence of hornfels and carbonates in the contact with Doran granite intrusion indicates a skarn contact metamorphism garnet deposit in the area. Garnet crystals of 1-2 cm size are observed in anhedral to subhedral form of mainly deep green color. They show isotropic and high relief features in polarized light associated with abundant fractures. Major element analysis indicates that the Baba-Nazar Garnet consists of andradite-grossularite groups but in three samples the pyrope content is exceptionally higher than that of the grossular. The presence of grossular and andradite is revealed by XRD analysis. All the garnet minerals with different colors indicate enrichment of Zr, U, Y, Ti and V and depletion of Ba, Hf, Nb, Ta, Sc, Co and Th. REE's elements normalized to chondrites, in garnet with various colors garnet indicate enrichment of LREE's compared to HREE's and weak positive europium and positive cerium anomaly.

Key words: Geochemistry, REE's, Garnet, Baba-Nazar, Takab, Sanandaj-Sirjan zone

* s.alipour@urmia.ac.ir